



72. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 07.06.2023 13:21 - Zaključeno



Posevki zelja namenjeni poletni pridelavi so na območju JV Slovenije v različnih razvojnih fazah (BBCH 19 in naprej).

Žeeli bi vas opozoriti na pojav *različnih gosenic* (sovke, kapusovega molja in kapusovega belina) na kapusnicah. Priporočamo, da pregledate posevke in v primeru, da jih tudi sami opazite, izvedete njihovo zaščito. Uporabite lahko enega izmed naslednjih pripravkov:

AFFIRM za zatiranje sovk in drugih gosenic metuljev v odmerku 1,5 kg/ha, uporaba v zelju, brokoliju in cvetači, karenca za zelje, 7 dni, za cvetačo in brokoli 12 dni,

AGREE za zatiranje gosenic škodljivih metuljev v odmerku 1 kg/ha, na kapusnicah, karenca ni potrebna,

BENEVIA za zatiranje gosenic metuljev v odmerku 0,4 - 0,5 l/ha, uporaba v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju ter brstičnem ohrovту, karenca za cvetačo, brokoli, glavnato zelje ter brstični ohrov je 7 dni,

DELFIN WG za zatiranje gosenic škodljivih *Lepidoptera* metuljev v odmerku 0,5 kg/ha uporaba na kapusnicah, karenca ni potrebna,

KARATE ZEON 5 CS za zatiranje kapusovega belina, kapusove sovke, zelenjadne sovke v odmerku 0,2 l/ha, uporaba na zelju, brstičnem ohrovtu, karenca 21 dni,

MIMIC za zatiranje kapusovega belina, kapusovega molja in različnih sovk v odmerku 0,3-0,4 l/ha uporaba na brokoliju, glavnatem zelju, glavnatem ohrovtu, kitajskem kapusu in listnem ohrovtu, karenca 14 dni,

LASER PLUS za zatiranje gosenic sovk iz rodu *Spodoptera* in *Heliotis* v odmerku 0,2 l/ha v brokoliju, cvetači, zelju in brstičnem ohrovту na prostem, karenca 3 dni,

LEPINOX PLUS za zatiranje gosenic metuljev (*Spodoptera littoralis*, *Spodoptera exigua*, *Helicoverpa armigera*, *Plutella xylostella*) v odmerku 1 kg/ha, v brokoliju, ohrovtu, glavnato zelje, brstični ohrov, karenca ni potrebna,

NEEMAZAL – T/S za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk v odmerku 3,0 l/ha, uporaba na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem, karenca 3 dni,

DECIS 100 EC za zatiranje gosenic iz reda *Lepidoptera*, kot so gosenice kapusovega belina ali kapusovega molja v odmerku 75 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, karenca 7 dni,

CORAGEN za zatiranje kapusovega molja, kapusove sovke, repnega belina, kapusovega belina in drugih gosenic škodljivih metuljev v odmerku 125 ml/ha, v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu, karenca 1 dan ,

VOLIAM za zatiranje kapusovega molja, kapusove sovke, repnega belina, kapusovega belina in drugih gosenic škodljivih metuljev v odmerku 125 ml/ha, v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu, karenca 3 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih oprševalcev.

Datum objave obvestila: 07.06.2023 13:21

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

Seznam registriranih FFS

