

## 80. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 09.06.2023 14:40 - Zaključeno



Na Primorskem so jabolane in hruške v fazi sekundarnega odpadanja plodičev in debeljenja plodov (BBCH 73 - 74).

### Škrlup

Obdobje primarnih okužb se je zaključilo, kljub temu je potrebno nadaljevati z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu, zlasti v nasadih kjer so prisotne pege škrlupa. Razmike med škropljenji prilagodite vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG v odmerku 1,88 kg/ha, Merplus v odmerku 2 L/ha, Orthocide 80 WG v odmerku 2,0 kg/ha, Scab 80 WG v odmerku 1,9 kg/ha ali Scab 480 SC v odmerku 3,13 L/ha. Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi aktivne snovi Syllit 400 SC v odmerku 1,9 L/ha. **Uporabo fungicidov na osnovi kaptana svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov.**

### Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko lahko uporabite naslednje pripravke: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Luna Care v odmerku 1 kg/m krošnje (maks. 3,0 kg/ha), Strobry WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 2,5 kg/ha, Terzel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,...) priporočamo, da škroplilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Microthiol disperss, Vertipin, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito) v odmerku 3 - 5 kg/ha. **Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.**

### Jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)

V spodnji Vipavki dolini na lokaciji Dombrava smo v minulih dneh zopet zabeležili velik ulov jabolčnega zavijača, ki je presegal prag škodljivosti. Sadjarjem na tem območju svetujemo ponovno škropljenje proti zavijaču. Za ta namen lahko uporabijo pripravke kot so: Coragen ali Voliam v odmerku 0,27 L/ha, Exirel v odmerku 0,9 L/ha, Delegate 250 WG v odmerku 0,3 kg/ha, Laser plus v odmerku 0,3 L/ha ali pripravek Mospilan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha.

### Marmorirana smrdljivka (*Halyomorpha halys*)

V spodnji Vipavske dolini so bili ulovi marmorirane smrdljivke v zadnjem tednu zaradi padavin nekoliko manjši. V nasadih že opazamo pojav ličink druge stopnje (L2), ki se hranijo na plodovih. Z vbadanjem v rastlinsko tkivo povzročajo nepravilnosti v razvoju plodov, iznakaženost, smoljenje in gnitje plodov. Ukrepanje proti škodljivki je smiselno le v primeru, da v nasadih opazate veliko število odraslih stenic ali ličink ter poškodbe na plodovih.

| Fitofarmacevtsko sredstvo | Odmerek / konc.          | Kultura                                                                               | OPOMBE                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mospilan 20 SG            | 0,05 %<br>Max. 0,5 kg/ha | sliva, jablana, hruška, breskev, nektarina, marelica                                  | Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno                                                                                                 |
| Karate Zeon 5 CS          | 0,018 %                  | hruška                                                                                | Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno                                                                                                 |
| Decis 2,5 EC              | 0,5 L/ha                 | sliva, jablana, hruška, breskev, marelica, oreh, leska                                | Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno<br>Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
| Aset Five                 | 0,064 %                  | pečkate in koščičaste sadne vrste, jagodičevje, agrumi, leska, aktinidija, kaki, figa | Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2023 do 14.10.2023<br>Na istem zemljišču dovoljena največ               |

|  |  |  |                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 3 tretiranja letno                                          |
|  |  |  | Sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja |

**Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

**Hrušev ožig (*Erwinia amylovora*)**

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Datum objave obvestila: 09.06.2023 14:40

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)

