

87. OBVESTILO O VARSTVU BUČK IN KUMAR - 16.06.2023 14:48 - Zaključeno



Kumarna plesen (*Pseudoperonospora cubensis*)

Zaradi padavin v preteklih dneh je priporočljivo opraviti preventivno zatiranje **kumarne plesni**. Za škropljenje uporabite pripravke iz spodnje tabele.

Registrirani pripravki za zatiranje kumarne plesni na bučkah in kumarah:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija	Karenca	Uporabno na
ALIETTE FLASH	4 kg/ha	3 dni	kumarah, dinjah, lubenicah, bučkah in bučah na prostem in v zavarovanih prostorih
CUPRABLAU Z 35 WP*	1,5 kg/ha	3 dni	bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke)
CUPRABLAU Z 35 WG*	1,5 kg/ha	3 dni	bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke)
CUPROXAT*	5,3 l/ha	3 dni	na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino), gojenih na prostem ali v zaščitnih prostorih
ENERVIN	1,5 kg/ha	7 dni	bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke) in bučnicah z neužitno lupino (dinje, lubenice)
MIRADOR 250 SC	1 l/ha	3 dni	Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru
			Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah,

ORTIVA	1 l/ha	3 dni	bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru
POLYVERSUM*	0,1 kg/ha	1 dan	Kumara (uporaba na prostem)
RANMAN TOP	0,5 l/ha	3 dni	na kumarah v zaščitenih prostorih; na kumaricah za vlaganje in bučkah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih
REVUS	0,6 l/ha		na dinjah, gojenih v zaščitenih prostorih
UNIVERZALNI FUNGICID*	1g/3-10 l vode/100m ²	1 dan	Kumara
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	3 dni	Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru

*dovoljeno v ekološki pridelavi

Poleg kumarne plesni je priporočljivo opraviti še preventivno zatiranje **bučne in kumarne pepelovke**. Za škropljenje priporočamo uporabo sredstev **na osnovi žvepla**, ki imajo stransko delovanje tudi na pršice.

Pripravek	Odmerek ali koncentracija	Karenca	Uporabno na
AQ-10*	35 g/ha	1 dan	bučnicah z užitno in z neužitno lupino, vključno z oljnimi bučami
BIOTIP SULFO 800 SC*	5- 7,5 l/ha	3 dni	na bučkah, bučah, kumarah in lubenicah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih
COSAN*	5-7,5 kg/ha	3 dni	bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem
DUAXO KONCENTRAT	V 1% koncentraciji oziroma v odmerku 10 ml/1L vode	3 dni	Kumare, bučke

DUAXO SPREJ	/ (AL)	3 dni	Kumare, bučke, gojene na prostem
FYTOSAVE*	2 l/ha	/	bučevkah (kumare, bučke, buče, kumarice, dinje), gojenih v zaščitnih prostorih
KUMULUS DF*	5-7,5 kg/ha	3 dni	bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem
MAVITA 250 EC	0,5 l/ha	3 dni	bučnicah z užitno in neužitno lupino
MICROTHIOL DISPERS*	5-7,5 kg/ha	3 dni	bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem
MICROTHIOL SC*	5,0-7,5 l/ha	3 dni	bučnicah z užitno (bučke, kumarice za vlaganje) in neužitno lupino (melone, lubenice, buče) na prostem
MICROTHIOL SPECIAL*	5-7,5 kg/ha	3 dni	bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem
MIRADOR 250 SC	1 l/ha	3 dni	Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru
ORTIVA	1 l/ha	3 dni	Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru
PEPELIN WG*	5-7,5 kg/ha	3	bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem

SCORE 250 EC	0,5 l/ha	3 dni	bučnicah z užitno in neužitno lupino
SERENADE ASO*	8 l/ha	Karenca ni potrebna.	bučah, lubenicah, dinjah, bučkah in kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem
SERCADIS PLUS	0,6 l/ha	3 dni	bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi) in neužitno lupino (dinje, orjaška buča, lubenice in drugi hibridi)
SONATA*	5-10 l/ha	Karenca ni potrebna.	kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah, gojenih v zaščitениh prostorih
SULFAR*	5-7,5 kg/ha	3	bučevkah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem
POLYVERSUM*	0,1-0,2kg/ha	1 dan	Kumara
TAEGRO*	0,185-0,37 kg/ha	1 dan	bučevkah z užitno in neužitno lupino (kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, dinjah, lubenicah in drugih bučevkah), gojenih v zaščitениh prostorih
THIOVIT JET*	5-7,5 kg/ha	3 dni	bučevkah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem
TOPAS 100 EC	0,5 l/ha	3 dni	kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitениh prostorih
UNIVERZALNI FUNGICID*	1-2g/4-15 l vode/100m ²	1 dan	Kumara
VERTIPIN*	6 l/ha	3 dni	kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, gojenih na prostem in v zaščitениh prostorih
			bučnicah z užitno

VINDEX 80 WG*	5-7,5 kg/ha	3	in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem
VITISAN*	1,5-3 kg/ha	1 dan	na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice) na prostem in v zaščitelih prostorih
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	3 dni	Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru

*dovoljeno v ekološki pridelavi

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! POZOR: uporaba sredstev na osnovi žvepla pri višjih temperaturah lahko privede do fitotoksičnosti! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Datum objave obvestila: 16.06.2023 14:48

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

