



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Vinska trta / 77. VARSTVO VINSKE TRTE

77. VARSTVO VINSKE TRTE - 17.06.2023 11:00 - Zaključeno



Vinska trta cveti, na zgodnjih legah se že oblikujejo plodiči (65-73 po lestvici BBCH).

V trenutnem obdobju cvetenja in oblikovanja plodičev je vinska trta ob spremenljivem vremenu občutljiva na okužbe z različnimi glivičnimi povzročitelji. Varstvo je potrebno izvajati redno in v razmikih 7-10 dni.

Proti okužbam *peronospora vinske trte* svetujemo nadaljevanje rabe sredstev s kombiniranim delovanjem: **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (v odmerku 2 kg/ha do konca cvetenja, potem 2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **PERGADO F** (3 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 kg/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), ali **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MAGMA TRIPLE WG** (3 kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), ... Pri sredstvih z a.s. fosetil-Al je potrebna zaporedna uporaba pripravkov s to snovjo. Od tretjega razvitega lista do cvetenja je v odmerku 1,25 kg/ha možna tudi raba **bakrovih pripravkov** **BADGE WG** ter od petega lista dalje **CUPROXAT** (5,3 l/ha), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha), ki pridejo v poštev tudi v ekološki pridelavi.

Oblikujejo se zelo ugodne razmere za okužbe grozdličev z *oidijem vinske trte*. Za varstvo svetujemo pripravke kot so: **KARATHANE GOLD 350 SC** (0,5 l/ha), **SPIROX D** (0,5 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **SPIROX** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13-0,3 med in tik po cvetenju), **UNICORN DF** (2,2 kg/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha), ... V ekološki pridelavi koristite: **VITISAN** (3-12 kg/ha) ali **KARBICURE** (5 kg/ha), **AQ-10** (35 g/ha), **TAEGRO** (0,185-0,37 kg/ha), **SONATA** (5 l/ha), **FYTOSAVE** (2 l/ha), ... in **prilagoditve na osnovi žvepla**.

Topli dnevi s temperaturami nad 15 °C so primerni tudi za rabo pripravkov na osnovi žvepla: **THIOVIT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL** / ali **DISPERSS**, **PEPELIN WG**, **SULFAR**, **VINDEX 80 WG**, **VERTIPIN**, ki v odmerku 3 do 8 kg(l)/ha zmanjšajo stopnjo napada *pršice trsne koderavosti* (*akarinoze*), *trsne pršice* (*erinoze*) in delujejo proti *oidiju vinske trte*.

V primeru neurja s točo svetujemo za varstvo vinske trte sredstva z aktivno snovjo **folpet** (Twingo, Forum star, Sfinga extra, Folpan gold, Mikal, Momentum, Magma triple, Pergado F, ...).

Vinogradnikom sporočamo, da pri spremljanju *ameriškega škrtatka* beležimo razvoj ličink v stadijih L1 in L2. Navodilo za njegovo obvezno zatiranje bo sledilo v enem naslednjih sporočil, ko bo vinska trta popolnoma zaključila s cvetenjem.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 17.06.2023 11:00

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

