

69. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC - 20.06.2023 14:08 - Zaključeno



V prvi polovici meseca junija ugotavljamo povečan nalet metuljkov kapusovega molja. Na komaj presajenih sadikah se močneje pojavljajo tudi bolhači. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic in odraslih bolhačev na mladih rastlinah.

Za zatiranje **bolhačev** so na kapusnicah registrirani naslednji insekticidi:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca (dni)	Registriran za: opombe
deltametrin	Decis 100 EC	63 ml/ha	7 dni	Zelje, cvetača, brstični ohrovt. Tretira se ob pojavu prvih škodljivcev. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Izogibati se je treba tretiranju pri visokih temperaturah zraka.
lambda cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15-0,2 L/ha	21 dni	Brstični ohrovt, zelje, kitajsko zelje, cvetača za listne uši in druge grizoče ter sesajoče žuželke
olje navadne ogrščice + piretrin	Raptol koncentrat	6,0 L/ha	3 dni	Kolerabica

Za zatiranje kapusovega molja so na kapusnicah registrirani naslednji insekticidi:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca (dni)	Registriran za: opombe
<i>Bacillus thuringiensis</i> Var. Kurstaki	Lepinox plus	1 kg/ha	Ni potrebna	brokoli, ohrovt, glavno zelje, kitajski kapus, brstični ohrovt, škropi se v času izleganja ličink.
deltametrin	Decis 100 EC	0,075 l/ha	7 dni	Brstični ohrovt, zelje, cvetača. Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk. Uporaba enkrat na sezono na istem zemljišču. Izogibati se je treba tretiranju pri visokih temperaturah zraka.
<i>Bacillus Thuringiensis</i> Var. Aizawai	Agree WG	1 kg/ha	Ni potrebna	Kapusnice. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni.
lambda cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,2 L/ha	7 dni za kitajsko zelje in cvetačo, 21 dni za zelje in brstični ohrovt	Zelje, brstični ohrovt za manjše uporabe v kitajskem zelju in cvetači. Uporaba ob pojavu škodljivih žuželk.
azadirachtin A	Neemazal - T/S	3,0 L/ha	3 dni	Na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem.
ciantraniliprol	Benevia	0,4 – 0,5 l/ha	7 dni	V cvetači, brokoliju, glavnem zelju ter brstičnem ohrovtu.
<i>Bacillus Thuringiensis</i> Var. Kurstaki	Delfin WG	0,5 kg/ha	Ni potrebna	Kapusnice. S sredstvom so na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni dobi v časovnem intervalu 7 dni.
klorantraniliprol	Coragen Voliam	125 ml/ha	1 dan	za zatiranje drugih gosenic škodljivih metuljev na cvetači, brokoliju, glavnem zelju in ohrovtu
tebufenozid	Mimic	0,3 – 0,4 L/ha	14 dni	Uporaba na brokoliju, glavnem zelju, glavnem ohrovtu, kitajskem kapusu in listnem

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 20.06.2023 14:08

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

[Seznam registriranih FFS](#)

