

**72. VARSTVO PEČKARJEV - 26.06.2023 13:10 - Zaključeno**

V tem času, za varstvo pred škrlupom priporočamo uporabo sredstev z aktivno snovjo kaptan (**Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Merplus, Scab 80 ali Scab 480 SQ**). Prav tako je uporaba dotičnih sredstev priporočljiva v nasadih, prizadetih v neurjih s točko. V sadovnjakih kjer ni prisotnih peg škrlupa lahko povečate razmike med škropljenji na 10-14 dni oz. škropljenje prilagodite padavinam.

V nasadih opažamo močne okužbe z listnimi pegavostmi, ki so običajno bolj pogoste v ekoloških sadovnjakih, vendar se pojavljajo tu v sadovnjaki z integriranim načinom pridelave. V ekološki sadovnjakih je za zmanjševanje okužb je priporočljiva izmenična uporaba sredstev **Curatio – žvepleno apnena brozga, Vitisan in Karbicare**, ki so namenjena tudi varstvu pred jablanovim škrlupom in jablanovo pepelovko.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko je priporočljiva uporaba registriranih **žveplovih pripravkov**, ki zmanjšujejo infekcijski potencial bolezni. Pri nekaterih sortah, je pri temperaturah nad 28 stopinj žveplo lahko fitotoksično. V močno okuženih nasadih je možna uporaba sistemskih fungicidov (**Luna experience, Luna Care, Stroby WG, Topas 100 EC, Zato 50 WG, Tercel ali Sercadis**).

V sadovnjakih kjer je bilo opravljeno prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču so ulovi metuljev nizki in pod pragom škodljivosti. V prihodnjih dneh pričakujemo povečevanje naleta zato bo potrebno ukrepati. Ker je številčnost škodljivca močno odvisna od posamezne lokacije, pridelovalcem svetujemo naj spremljajo nalet metuljev s feromonskimi vabami in šele ob preseženem pragu škodljivosti (7 metuljev/past/teden) opravijo škropljenje. Na voljo so sredstva **Delegate, Mimic, Coragen, Voliam in Laser plus** (učinkovito zatira tudi gosenice drugih zavijačev). Kjer imate težave z listnimi ušmi, priporočamo uporabo sredstva **Mospilan 20 SG**, ki deluje tudi proti nimfam marmorirane smrdljivke, katere že opažamo v nasadih. Kjer ste imeli v preteklem letu velike z jabolčnim zavijačem je priporočljivo dodajanje polovičnega **odmerka virusa granuloze (Madex max, Carpovirusine)**, ki povzroča fiziološko oslabitev gosenic. Virusni pripravki so občutljivi na sončno svetlobo zato jih nanašajte v večernem času oz. oblačnem vremenu.

V ekoloških nasadih lahko poleg zgornjih dveh virusnih pripravkov, uporabite insekticid **Laser plus**, ki učinkovito zatira tudi gosenice drugih zavijačev. V ta namen so na voljo tudi pripravki **Agree, Lepinox plus in Delfin WG**.

Datum objave obvestila: 26.06.2023 13:10

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

