

109. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 14.07.2023 15:25 - Zaključeno



Jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)

Na območju Primorske v zadnjem tednu opažamo velike ulove metuljkov jabolčnega zavijača, kar je povezano s pojavom drugega rodu. Prag škodljivosti, ki v tem obdobju znaša 5-7 metuljkov /vabo/teden je bil presežen na območju Vipavske doline in v Brkinih. Sadjarjem na tem območju svetujemo, da v naslednjih dneh opravijo škropljenje proti drugemu rodu zavijača. V ta namen lahko uporabijo naslednje pripravke:

Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov	Odmerek / konc.
Affirm	emamektin	1 kg/ha/m višne krošnje max. 4,0 kg/ha
Afirm opti	emamektin	2,0 kg/ha
Coragen	klorantraniliprol	0,27 L/ha
Delegate 250 WG	spinoteram	0,3 kg/ha
Exirel	ciantraniliprol	0,9 L/ha
Laser plus	spinosad	0,3 L/ha
Mospilan 20 SG	acetamiprid	0,05 % Max. 0,5 kg/ha

Poleg naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: Lepinox plus v odmerku 1 kg/ha, Carpovirusine v odmerku 1L/ha ali Madex Max v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Uporabite lahko tudi pripravka Delfin WG ali Agree, ki sta registrirana za zatiranje gosenic drugih metuljev. Našeti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Škrlup

Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG v odmerku 1,88 kg/ha, Merplus v odmerku 2 L/ha, Orthocide 80 WG v odmerku 2,0 kg/ha, Scab 80 WG v odmerku 1,9 kg/ha ali Scab 480 SC v odmerku 3,13 L/ha. **Uporabo fungicidov na osnovi kaptana svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov.**

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 14.07.2023 15:25

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS

