



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Krompir
/ 78. OBVESTILO O SUŠENJU (DESIKACIJI) KROMPIRJEVE CIME PRED IZKOPOM KROMPIRJA

78. OBVESTILO O SUŠENJU (DESIKACIJI) KROMPIRJEVE CIME PRED IZKOPOM KROMPIRJA - 25.07.2023 12:23 - Zaključeno



Pred predvidenim izkopom lahko opravite desikacijo - krompirjevko lahko poškopite s herbicidoma: **Spotlight plus** (a.s. karfentrazon etil), ki ima **Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin, dovoljena uporaba od 22.6.2023 do 21.10.2023**, ali s herbicidom **Beloukha** (a.s. pelargonska kislina).

Fitofarmacevtsko sredstvo **SPOTLIGHT PLUS** je formulirano v obliki mikroemulzije (ME) in se uporablja za sušenje (desikacijo) krompirjevke **v jedilnem in semenskem krompirju** v času fiziološke zrelosti oz. ko so gomolji zreli (čvrsta kožica) ali 7 dni pred izkopom. Sredstvo se uporabi v odmerku 1,0 L/ha. Če je krompirjevka zelo bujna, se jo nekaj dni pred tretiranjem zmulči na višino 10-15 cm, nato pa se 2-4 dni po mulčenju uporabi sredstvo SPOTLIGHT PLUS v odmerku 1 L/ha. V primeru, da je potrebno še eno tretiranje, je najvišji dovoljeni odmerek za drugo tretiranje 0,6 L/ha. Časovni presledek med dvema tretiranjema je 7 dni. Priporočena poraba vode je 300-600 L/ha.

OPOZORILO: Sredstvo SPOTLIGHT PLUS deluje kontaktno. Kakovost desikacije je odvisna od natančnosti nanosa sredstva. Sredstvo je potrebno enakomerno nanesti na tretirano površino. Priporoča se, da se tretira zjutraj, ob prisotnosti vlage. Za doseganje optimalne desikacije se je treba izogibati tretiranju v ekstremnih vremenskih razmerah: pretirana suša ali vlaga, visoke temperature zraka in zelo nizka zračna vlaga. S sredstvom SPOTLIGHT PLUS se ne priporoča tretiranje nasadov krompirja, ki so močno napadeni s plesnijo. Preprečiti je treba zanašanje na sosednje gojene rastline. KARENCA: Karenca je 7 dni. **Obvezno je vodenje evidence uporabe FFS.**

POSEBNO OPOZORILO: Zaradi visokega tveganja za onesnaženje podzemne vode se sredstvo lahko uporabi samo na omejenem območju in le na površinah, kjer je podzemna voda (podtalnica) na globini večji od 10 m.

Fitofarmacevtsko sredstvo **Beloukha** se v krompirju uporablja za sušenje krompirjevke v odmerku 16 L/ha, priporočena poraba vode je 200-400 L/ha. Krompirjevko se tretira, ko imajo gomolji zeleno debelino oziroma najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni v razmiku 5-7 dni. Krompirjevko se 1 dan pred uporabo sredstva Beloukha zmulči na višino 15-20 cm. Predhodno mulčenje je potrebno, da aktivna snov (pelargonska kislina) lažje prodre v listno maso. Uporaba sredstva v krompirju omogoči enakomernejše dozorevanje pridelka, lažje ločevanje cime od gomoljev, olajšan strojni izkop in manj umazan pridelek. Kožica gomoljev je čvrstejša, kar pomeni manj poškodb med izkopom in manj okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo. Karenca za Beloukha za krompir je zagotovljena s časom uporabe!

Pred uporabo navedenih FFS pozorno preberite priložena navodila za uporabo in opravite desikacijo v skladu s predpisanimi navodili!

Na krompiriščih, kjer krompirjevko mehansko kosite, le to čim prej po košnji odstranite z njiv in počakajte z izkopom vsaj 14 dni, da kožica na krompirjevih gomoljih pred spravilom postane bolj čvrsta.

Datum objave obvestila: 25.07.2023 12:23

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

