

**89. Stenice na vrtninah - 26.07.2023 08:02 - Zaključeno**

Na vrtninah opažamo povečan pojav raznih vrst stenic, predvsem na paprikah in drugih plodovkah, bučnicah, kapusnicah ter fižolu, blitvi in drugod. Gre za žuželke, ki imajo ustni aparat oblikovan za zbadanje v rastlinsko tkivo in sesanje sokov. Na mestih sesanja se najprej pojavijo drobne svetle točke, čemur sledijo deformacije tkiv - listov, pecljev, poganjkov, cvetov ali plodov. Poleg najpogostejših domačih vrst (zelena smrdljivka, sivi smrdljivec, vrste iz rodov *Lygus*, *Eurydema* in še nekatere), se v zadnjih letih tudi pri nas širi marmorirana smrdljivka (*Halyomorpha halys*), zelo škodljiva tujerodna vrsta, ki napada številne kmetijske rastline, predvsem sadne vrste in vrtnine. Zatiranje stenic z insekticidi je težavno, saj veljajo za precej odporne škodljivce. Jajčna legla najdemo na spodnjih streneh listov, če jih odkrijemo jih mehansko uničimo. Pri nas sta proti marmorirani smrdljivki na paradižniku, papriki, jajčevcu in kumarah na prostem dovoljena insekticida **Mospilan** in **Karate Zeon** (oba imata registracijo za manjše uporabe).

Pred rabo fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 26.07.2023 08:02

Obvestilo prognoističnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Meta

Pripravila: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

