



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Plodovke

/ 97. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR IN BUČK

97. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR IN BUČK - 26.07.2023 13:33 - Zaključeno



V teku je pridelava kumaric za solato in vlaganje. Glede na to, da so stalno ugodne razmere za nadaljnji razvoj in širjenje **kumarne plesni** (*Pseudoperonospora cubensis*), je priporočljivo, da se redno izvaja varstvo posevka. Za preprečevanje širjenja lahko uporabite enega od pripravkov:

MIRADOR 250 SC v odmerku 1 l/ha na kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč), karenca 3 dni.

ORTIVA v odmerku 1 l/ha na kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč), karenca 3 dni.

ZAFTRA AZT 250 SC v odmerku 1 l/ha na kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč), karenca 3 dni.

CUPROXAT v odmerku 5,3 l/ha na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino), karenca 3 dni.

RANMAN TOP v odmerku 0,5 l/ha na kumarah v zaščiteneh prostorih in kumaricah za vlaganje in bučkah, karenca 3 dni.

ALIETTE FLASH v odmerku 4 kg/ha na kumarah, dinjah, lubenicah, bučkah in bučah, karenca 3 dni.

ENERVIN v odmerku 1,5 kg/ha na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke) in bučnicah z neužitno lupino (dinje, lubenice), karenca 7 dni.

CUPRABLAU Z 35 WP v odmerku 1,5 kg/ha za manjše uporabe v bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke), karenca 3 dni.

CUPRABLAU Z 35 WG v odmerku 1,5 kg/ha za manjše uporabe na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke), karenca 7 dni.

POLYVERSUM v odmerku 0,1 kg/ha, na kumarah, s sredstvom se tretira foliarno, na prostem. Število tretiranj ni omejeno.

UNIVERZALNI FUNGICID 1 g/3-10 l vode/100m², na kumarah, s sredstvom se tretira foliarno, na prostem. Število tretiranj ni omejeno, karenca je 1 dan.

Na posevkih bučevk se pojavlja tudi **pepelovka bučnic** (*Erysiphae orontii*, *Spaerotheca fusca*, *Oidium sp.*, *Erysiphe cichoracearum*). Za njeno zatiranje oziroma preprečevanje pojava lahko uporabite:

MIRADOR 250 SC v odmerku 1 l/ha na bučkah in kumaricah za vlaganje, kumarah, karenca 3 dni.

ORTIVA v odmerku 1 l/ha na kumarah, kumaricah za vlaganje in bučkah, karenca 3 dni.

ZAFTRA AZT 250 SC v odmerku 1 l/ha, na kumarah, kumaricah za vlaganje in bučkah, karenca 3 dni.

TOPAS 100 EC v odmerku 0,5 l/ha na kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščiteneh prostorih, karenca 3 dni.

COLLIS v odmerku 0,5 l/ha v zaščiteneh prostorih na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino), karenca 3 dni.

SONATA v odmerku 5 – 10 l/ha na kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah, karenca ni potrebna.

AQ-10 v odmerku 35 g/ha na bučnicah z užitno in z neužitno lupino, vključno z oljnimi bučami, karenca 1 dan.

POLYVERSUM v odmerku 0,1-0,2 kg/ha na kumarah, karenca 1 dan.

UNIVERZALNI FUNGICID v odmerku 1 – 2 gr / 4 – 15 l vode /100 m², karenca 1 dan.

MAVITA 250 EC v odmerku 0,5 l/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni.

SCORE 250 EC v odmerkih 0,5 l/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni.

COSAN v odmerku 5 – 7,5 kg/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah), karenca 3 dni.

KUMULUS DF v odmerku 5 – 7,5 kg/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) karenca 3 dni.

MICROTHIOL DISPERS v odmerku 5 – 7,5 kg/ha bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah), karenca 3 dni.

MICROTHIOL SC v odmerku 5 – 7,5 kg/ha na bučnicah z užitno (bučke, kumarice za vlaganje) in neužitno lupino (melone, lubenice, buče) karenca 3 dni.

MICROTHIOL SPECIAL v odmerku 5 – 7,5 kg/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah), karenca 3 dni.

PEPELIN v odmerku 5 – 7,5 kg/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah), karenca 3 dni.

SULFAR v odmerku 5 – 7,5 kg/ha na bučevkah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah), karenca 3 dni.

VINDEX 80 WG v odmerku 5 – 7,5 kg/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah), karenca 3 dni.

SERENADE ASO v odmerku 8 l/ha na kumarah, dinjah, lubenicah in bučkah v zaščiteneh prostorih, karenca ni potrebna.

VITISAN v odmerku 1,5 – 3 kg/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice), karenca 1 dan.

KARBICURE v odmerku 3 kg/ha na kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, dinjah, lubenicah in bučah ter drugih bučevkah z užitno in

neužitno lupino, karenca 1 dan.

BIOTIP SULFO 800 SC v odmerku 5 – 7,5 l/ha na bučkah, bučah, kumarah in lubenicah, karenca 3 dni.

VERTIPIN v odmerku 6 l/ha na kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, karenca 3 dni.

SERCADIS PLUS v odmerku 0,6 l/ha na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi) in neužitno lupino (dinje, orjaška buča, lubenice in drugi hibridi), karenca 3 dni.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 26.07.2023 13:33

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

[Seznam registriranih FFS](#)

