



## 124. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 09.08.2023 14:48 - Zaključeno



### Oljčna muha

Pri zadnjem pregledu vab v večini oljčnikov nismo opazili večje spremembe glede prisotnosti škodljivke glede na pretekli teden. Malo je bil prag škodljivosti presežen na naslednjih lokacijah: Gažon, Gornje Cerovo, Kavaliči, Kromberk, Lokvica, Padna, Sermin in Trebeše.

Kljub malo številčni prisotnosti oljčne muhe pri pregledu plodov na posameznih lokacijah opazamo povečano poškodovanost plodov. To dejstvo lahko povežemo z manjšo količino pridelka v posameznih oljčnikih.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu [www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/](http://www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/)

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčneje pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) priporočamo, da po zadnjih padavinah obnovijo **ukrepanje z zastrupljeno vabo** po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek **GF 120** v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo **Naturalis** na osnovi entomopatogene glive *Bauveria bassiana* v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi v integrirani pridelavi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina **Decis 2,5 EC** v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega **prag škodljivosti** (več kot 10% plodov z odloženimi jajčeci in ličinkami prvega razvojnega stadija) priporočamo **kurativno škropljenje** po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Ukrepamo lahko s sistemskim sredstvom na osnovi acetamiprida **Mospilan 20SG** v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Omenjen pripravek deluje tudi proti **marmorirani smrdljivki**, ki jo opazamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

V kolikor proti oljčni muhi uporabljate odvrčala, priporočamo, da po zadnjih padavinah obnovite ukrepanja **z odvrčalnimi sredstvi** na osnovi kaolina ali talka. Škropilni brozgi lahko dodate tudi enega izmed sredstev na osnovi bakra (**Cuprablau Z** ali **Nordox**), ki delujeta proti boleznim oljk ter še dodatno razkuževalno in odvrčalno proti oljčni muhi.

**Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Priporočamo redno spremljanje škodljivke s pomočjo feromonskih vab ali rumenih lepljivih plošč.

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 09.08.2023 14:48

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

[Seznam registriranih FFS](#)

