



84. OBVESTILO O VARSTVU PARADIŽNIKA PRED BOLEZNIMI - 16.08.2023 09:05 - Zaključeno



Rjava žametna paradižnikova pegavost

Pri pridelavi paradižnika, ob povišani zračni vlažnosti v nočnem in dopoldanskem času v zadnjih dneh, opazamo pojav in širjenje rjave žametne paradižnikove pegavosti (*Cladosporium fulvum*). Pridelovalcem paradižnika proti omenjeni bolezni priporočamo uporabo fungicidov: **Mavita 250 EC** ali **Score 250 EC** (oba registrirana le za pridelavo na prostem; 0,5 L/ha = 5 mL na ar, K = 7 dni, največ 2 krat v eni rastni sezoni), oba fungicida delujeta tudi na črno listno pegavost paradižnika (*Alternaria solani*) in tudi na paradižnikovo pepelovko (*Leveillula taurica*).

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!

Paradižnikova/krompirjeva plesen in črna listna pegavost paradižnika

V zadnjih dneh so zelo ugodni pogoji za širjenje paradižnikove plesni (*Phytophthora infestans*) in nekoliko manj ugodni pogoji za širjenje črne listne pegavosti paradižnika (*Alternaria solani*). Tudi pri gojenju paradižnika v zavarovanih prostorih smo tam, kjer imajo slabo zračene prostore že našli pege paradižnikove plesni. V tem času priporočamo uporabo fungicidov s kratkimi karencami: **Cuprablau Z 35 WP** (samo na prostem, deluje tudi na črno listno pegavost paradižnika, 3 kg/ha, paradižnik za svežo uporabo K = 3 dni, paradižnik za predelavo K = 10 dni, največ 3 krat v eni rastni sezoni), **Kocide 2000** (samo na prostem, 2 kg/ha, paradižnik za svežo uporabo K = 3 dni, paradižnik za predelavo K = 10 dni, največ 5 krat v eni rastni dobi, uporaba ročne škropilnice ni dovoljena), **Mirador 250 SC** ali **Ortiva** ali **Zaftra AZT 250 SC** (vsi trije delujejo tudi na črno listno pegavost paradižnika, 1 L/ha = (10 mL/ar, K = 3 dni, v zaščitenem prostoru največ 2 krat, na prostem največ 3 krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču). Mirador, Ortiva in Zaftra delujejo tudi na paradižnikovo pepelovko (*Leveillula taurica*) in na pepelovke (*Erysiphe* sp.). **Nordox 75 WG** (1 kg/ha, paradižnik za svežo uporabo K = 3 dni, paradižnik za predelavo K = 10 dni, največ 5 krat v eni rastni dobi), **Pergado C** (5 kg/ha, paradižnik K = 3 dni, največ 3 krat v eni rastni dobi), **Revus** 0,6 L/ha, K = 3 dni, največ 4 krat v eni rastni dobi), **Revus top** (deluje tudi na črno listno pegavost paradižnika, 0,3 - 0,6 L/ha = (3 - 6 mL/ar glede na višino rastlin, K = 3 dni, največ 3 krat v eni rastni dobi). Za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti in alternarijske pegavosti plodov (*Alternaria alternata*) lahko uporabite **Sercadis plus** (1 L/ha, K = 3 dni, največ 2 krat v enem rastnem ciklusu).

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!

Datum objave obvestila: 16.08.2023 09:05

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

