

2. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 12.02.2024 09:00 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)

Na izpostavljenih legah so brsti marelic že napeti. Nasade, ki so v fenološki fazi B-C po Baggioliniju ali BBCH51-53 je potrebno škropiti proti **listni luknjičavosti koščičarjev**.

Za škropljenje nasadov uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 12.02.2024 09:00
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
[Seznam registriranih FFS](#)