

4. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 15.02.2024 15:40 - Zaključeno

**Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)**

Na izpostavljenih legah so brsti marelic že napeti. Nasade, ki so v fenološki fazi B-C po Baggioliniju ali BBCH51-53 je potrebno škropiti proti **listni luknjičavosti koščičarjev**.

Za škropljenje nasadov uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

V letošnjem letu je dovoljenje za nujne primere na marelicah za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev pridobilo sredstvo Curatio žvepleno apnena brozga na osnovi kalcijevega polisulfida (apneno žveplo). Omenjen pripravek se uporabi v odmerku 6 l na ha na meter višine krošnje. Sredstvo smejo uporabljati poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 15.02.2024 15:40

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

