

6. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 21.02.2024 08:31 - Zaključeno

**Breskova kodravost (*Taphrina deformans*) in listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)**

V ravninskih nasadih breskev so brsti že nabrekli. Če še niste priporočamo, da pred dežjem opravite preventivno škropljenje proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev**. Za škropljenje uporabite **bakrove pripravke**. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Registrirana sredstva na osnovi **bakra**:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

V letošnjem letu je dovoljenje za nujne primere na breskvah za zatiranje breskove kodravosti in listne luknjičavosti koščičarjev pridobilo sredstvo Curatio žvepleno apnena brozga na osnovi kalcijevega polisulfida (apneno žveplo). Omenjen pripravek se uporabi v odmerku 6 l na ha na meter višine krošnje. Sredstvo smejo uporabljati poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Zaradi toplega vremena je na izpostavljenih legah prišlo do hitrega razvoja breskev in nektarin, saj so rastline že fenološki fazi C - D po Baggoliniu ali 55 – 57 po BBCH lestvici (člašni listi odprti). V omenjenih nasadih za zatiranje **breskove kodravosti** uporabimo pripravek Syllit 400 SC v odmerku 2,25 l/ha ali Syllit 544 SC v odmerku 1,65 l/ha.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 21.02.2024 08:31

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

