

7. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 21.02.2024 08:33 - Zaključeno

**Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)**

Na poznih legah so brsti marelic že nabrekli. Če še niste je priporočljivo, da nasade, ki so v fenološki fazi B-C po Baggioliniju ali BBCH51-53 pred padavinami še poškropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev**.

Za škropljenje nasadov uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

V letošnjem letu je dovoljenje za nujne primere pridobilo sredstvo Curatio žvepleno apnena brozga na osnovi kalcijevega polisulfida (apneno žveplo). Omenjen pripravek se uporabi v odmerku 6 l na ha na meter višine krošnje.

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Na južnih legah nasadi marelic postopno prehajajo v fazo cvetenja (fenofaza BBCH 59 - 60 ali E po Baggioliniju). Ko bo odprtih 10 % cvetov je priporočljivo opraviti škropljenje proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite naslednje pripravke.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
AMYLO-X	1,5 do 2,5 kg/ha
CHORUS 50 WG	0,5 kg/ha
DUAXO KONCENTRAT	1,1 l/višinski meter krošnje/ha; maksimalni odmerek 3,3 l/ha
PROLECTUS	330 g sredstva/višinski meter krošnje/hektar, maksimalni odmerek 1 kg/ha
REYONA	1,8 l/ha
SERENADE ASO	8 l/ha
SIGNUM	0,25 kg/višinski meter krošnje/ha; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha
SWITCH 62,5 WG	0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha
ZENBY	0,9 l/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 21.02.2024 08:33

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

