

**2. Varstvo marelic - 27.02.2024 08:02 - Zaključeno**

Marelice so v fazi nabrekanja brstov (BBCH 01 – 03). Zato prvo škropljenje **marelic** proti **listni luknjičavosti koščičarjev** opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Za zatiranje okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev je **izdano dovoljenje za nujne primere sredstvu CURATIO žvepleno apnena brozga**:

- V MARELICAH za zatiranje okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev (*Stigmia carpophila*) in marelično pepelovko (*Podosphaera tridactyla*) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.

**POZOR: Sredstvo smejo uporabljati le poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo!**

Datum objave obvestila: 27.02.2024 08:02

Obvestilo prognošičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

