

6. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.1 - 04.03.2024 08:53 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo C – C₃ po Fleckingerju oz. BBCH 53 - 54 (odpiranje brsta – stadij mišjega ušesca).

Pregled zimskih plodišč **JABLANOVEGA ŠKRLUPA** je pokazal, da so askospore v posameznih plodiščih že dozorele. Do prvih primarnih okužb lahko pride le v primeru, če bo zaradi padavin listje in že odprti brsti mokri daljši čas (pri povprečni temperaturi 8 °C - 20 ur) in to predvsem v nasadih, kjer lanskoletno listje iz nasada ni bilo odstranjeno – pometeno in kjer so jablane dosegle zgoraj omenjeno fenološko fazo.

V primeru vremenske napovedi z obilnimi padavinami (nad 10 L/m²) je potrebno poškropiti jablane, ki so v razvoju hitreje in to še **pred** napovedanimi padavinami. Priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov:

- Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha),
- Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha),
- Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha),
- Kocide 2000 (2 kg/ha).

Vsi naštetni bakrovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

V nekaterih nasadih smo ujeli hroščke **JABLANOVEGA CVETOŽERJA**, našli smo tudi prve vbode, medtem ko odloženih jajčec še nismo našli. Priporočamo pregled nasadov, predvsem tistih, kjer je škoda v preteklih letih že bila ugotovljena in nasadov v bližini gozdov. V teh nasadih priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste – prag škodljivosti je presežen kadar je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku).

V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti, priporočamo uporabo pripravka **Asset five** (0,96 L pri porabi vode največ 1500 L na ha) v razvojni fazi B – C₃, oz. BBCH 51 – 54, ob prisotnosti škodljivih žuželk. Na istem zemljišču se lahko tretira **NAJVEČ** dvakrat. Tretiranje se po potrebi ponovi 7 dni po predhodnem. S sredstvom se tretira zvečer, oziroma v najhladnejših urah dneva. **Priporočeni pH škropilne brozge je od 5 do 6.** Škropilno brozgo je zato treba po potrebi zakisati s sredstvom za uravnavanje kislosti škropilne brozge (npr. Pekacid, pH minus,...) ali z dodatkom citronske kisline (ekološka vzgoja). Glede mešanja z drugimi sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom za sredstvo.

Pripravek **Asset five** hkrati učinkuje tudi na sesajoče žuželke, npr. **hruševe bolšice**.

Datum objave obvestila: 04.03.2024 08:53

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

