



8. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 04.03.2024 11:11 - Zaključeno



VARSTVO MARELIC

V fenološki fazi začetka cvetenja marelic, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno opraviti prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko pripravke: **Amylo-X** ali **Chorus 50 WG** ali **Duaxo koncentrat** ali **Mavita 250 EC** ali **Prestop** ali **Prolectus** ali **Revyona** ali **Score 250 EC** ali **Switch 62,5 WG** ali **Signum** ali **Serenade ASO** ali **Taegro** ali **Zenby** v predpisanih odmerkih.

Našteta sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v večernem času.

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ TER SLIV IN ČEŠPELJ

Češnje in višnje ter slive in češplje so v fenološki fazi napenjanja brstov. V tej fenološki fazi je čas za škropljenje proti listni luknjičavosti koščičarjev. Uporabite lahko pripravek **Badge WG** (3,5 kg/ha) ali **Cuprablau Z 35 WG** (1,6-2 kg/ha) ali **Cuprablau Z 35 WP** (2 kg/ha).

Za spremljanje populacije **rumene ali črne češpljeve grizlice** priporočamo, da se na slive in češplje v začetku cvetenja izobesijo **bele lepljive plošče**.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 04.03.2024 11:11

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

