

## 17. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 08.03.2024 09:55 - Zaključeno

**Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)**

Brsti češenj in višenj so v fenofazi C po Baggio liniju ali BBCH55 - Vidni posamezni cvetni popki (še vedno zaprti), na kratkih peceljih, zelene luske rahlo odprte). Pred padavinami nasade škropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev**. Uporabite registrirana sredstva na osnovi **bakra**.

## Registrirani pripravki:

| Sredstvo          | Odmerek ali koncentracija |
|-------------------|---------------------------|
| Badge WG          | 3,5 kg/ha                 |
| Cuprablau Z 35 WG | 1,6-2 kg/ha               |
| Cuprablau Z 35 WP | 2 kg/ha                   |

**Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 08.03.2024 09:55

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

