

9. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 08.03.2024 12:59 - Zaključeno



Nasadi breskev nadaljujejo z razvojem in prehajajo v cvetenje (56 – 60 po lestvici BBCH).

V nestanovitnem vremenu je med brstenjem potrebno še vedno vzdrževati zaščito pred okužbami z **breskovo kodravostjo**. Do konca cvetenja lahko uporabite **SYLLIT 400 SC** (2,25 l/ha), kateri je v rastni dobi dovoljen največ 2 ×.

Z začetkom cvetenja, ob deževnem vremenu, za preprečevanje okužb **cvetne monilije** svetujemo še nanos **AMYLO-X** (1,5 do 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,2 l/ha na m višine krošnje, do največ 0,6 l/ha), **LIBRETO** (1 l/ha), **PRESTOP** (2 kg/ha), **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha) ali **SWITCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha),... Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 08.03.2024 12:59

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

