

19. OBVESTILO OO VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 08.03.2024 13:07 - Zaključeno



V minulem tednu je zaradi otoplitve razvoj hrušk in jablan zelo napredoval. Zgodnje sorte hrušk (Junjska lepota) na izpostavljenih legah v Vipavski dolini že dosegajo fenofazo vidnih zelenih popkov (BBCH 55), zgodnje sorte jablan pa fenofazo mišjega ušesa (BBCH 54). Ostale sorte hrušk in jablan v nižinskih legah začenjajo brsteti BBCH 53.

Ob padavinah se že lahko pojavijo prvi izbruhi askospor ter povzročijo zgodnje okužbe s škrlupom. Za zaščito zgodnjih sort hrušk in jablan, ki imajo že razvite liste, priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi metirama (Polyram) v odmerku 2,0 kg/ha ali dodina (Syllit 400 SC) v odmerku 1,9 L/ha. V nasadih hrušk in jablan, ki brstijo, je zdaj pravi čas za uporabo bakrenih pripravkov.

Uporabite lahko:

Sredstvo	Odmereki, konc.
Cuprablau Z 35 WP	3,0 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	3,0 kg/ha
Cuprablau Z 50 WP	2,0 kg/ha
Kocide 2000	2 kg/ha
Badge WG WG	2,9 kg/ha
Nordox 75 WG	1,6 kg/ha

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti tudi proti **hruševemu ožigu (*Erwinia amylovora*)**, zato je njihova uporaba priporočljiva v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, zlasti pa na območju spodnje Vipavske doline, kjer je ta nevarna bakterijska bolezen pečkarjev prisotna.

Datum objave obvestila: 08.03.2024 13:07

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)

