

12. VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ - 08.03.2024 13:09 - Zaključeno



Nasadi sliv in češpelj so tik pred cvetenjem (55 – 59 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem svetujemo, da opravite varstvo pred **cvetno monilijo**. Nevarnost okužbe je večja v primeru deževnega vremena. Priporočamo dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo: **AMYLO-X** (1,5 do 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha), **PRESTOP** (2 kg/ha), **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), **REVVONA** (1,8 l/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), **SWITCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha) ali **TAEGRO** (0,185-0,37 kg/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso, Taegro in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

V času pred začetkom cvetenja je potrebno za spremljanje naleta **češpljevih grizlic** v nasade namestiti **bele lepljive plošče** (2 na ha). Prag škodljivosti je ob zaključenem cvetenju 30 ulovljenih osic. Takrat plošče iz nasada odstranite in v primeru preseženega praga ukrepate z MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.; oz. 4 g na 10 l vode).

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrastí. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 08.03.2024 13:09

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

