

## 7. VARSTVO PEČKARJEV - 12.03.2024 14:29 - Zaključeno



Toplo vreme je močno pospešilo razvoj sadnega drevja. Trenutni fenološki razvojni stadiji jablan in hrušk se močno razlikujejo glede na pridelovalno področje, sortiment in lego. Tako so na nekaterih toplih legah, zgodnje sorte jablan že dosegle stadij mišjega ušesca. Hruške že dosegajo stadij konca nabrekanja brstov. Med tem so na hladnih, poznih legah, jabolane komaj začele napenjati brste. Zato pridelovalce opozarjamo naj varstvene ukrepe prilagodijo fenološkemu razvoju v svojih nasadih.

Toplo in deževno vreme predstavlja nevarnost za prve okužbe s škrlupom, predvsem v nasadih, ki so nekoliko bolj razviti. V večini nasadov, ki so še v fazi brstenja je primerna uporaba bakrovih pripravkov kot so **Badge WG**, **Cuprablau Z 35 WP/WG**, **Cuprablau Z 50 WP**, **Kocide 2000**, **Nordox 75 WG**. V nasadih kjer so že razviti prvi lističi pa je priporočena uporaba fungicida **Polyram** na osnovi a.s. metiram ali pripravkov **Syllit 400 SC** oz. **Syllit 544 SC** na osnovi dodina.

V ekološki pridelavi je od razvojne faze mišje uho naprej možna uporaba pripravka **Curatio žvepleno apnena brozga**, ki ima dovoljenje za nujne primere. Sredstvo je namenjeno obvladovanju bolezni kot so jablanov škrlup, listne pegavosti in jablanova pepelovka.

Toplo vreme omogoča uporabo in dobro učinkovitost oljnih pripravkov, ki so namenjeni zatiranju prezimelih stadijev kaparjev, rdeče sadne pršice in listnih uši. Uporabite lahko pripravke **Frutapon**, **Ovitex**, **Belo olje karsia** in **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat**.

Še vedno priporočamo izvajanje varstva pred sesajočimi organizmi (hruševim bolšicam) z metodo odvrčanja z nanosom **kislih glin** (Malusan, Cutisan). Nanos je potrebno večkrat obnoviti, še posebno po padavinah, ki sperejo oblogo. Tovrstne pripravke se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi, saj gre za fino mleti kaolin.

Pridelovalci bodite pozorni na napad jablanovega cvetožera. Še posebno bodite pozorni v nasadih, ki ležijo v bližini gozdov ali v nasadih, v katerih ste imeli težave v preteklih letih. Napad škodljivca je najintenzivnejši, ko drevesa vstopijo v razvojno fazo zelenega vršička (BBCH 53). Takrat je ob preseženem pragu škodljivosti potrebno ukrepanje. Na voljo je insekticid **Asset five**, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Škropljenje opravite v večernih urah in po potrebi ponovite v razmaku sedmih dni. Prag škodljivosti je presežen kadar je nabodenih več kot 15 % brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) ali 30 % (pri močnem nastavku), oziroma so na več kot 15 % pregledanih brstov odložena jajčeca. Pri metodi stresanja je prag presežen, če ulovimo 20 do 30 hroščkov /100 vej.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in veljavne registracije!**

Pripravila: David Snoj in Vesna Kocjan  
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 12.03.2024 14:29  
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije  
Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič  
Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**  
[Seznam registriranih FFS](#)

