

8. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 12.03.2024 14:32 - Zaključeno



Zgodnje sorte breskev in nektarin, ki ležijo na izredno toplih legah osrednje Slovenije že prehajajo v cvetenje. V tem času je pred padavinami potrebno vzdrževati zaščito pred okužbami z breskovo kodravostjo, do konca cvetenja. Na voljo je pripravek **Syllit 400 SC** ali **Syllit 544 SC**.

V času cvetenja in deževnega vremena, je treba preprečevati okužbe s cvetno monilijo. Pridelovalci lahko izbirajo med naslednjimi pripravki; **Amylo-X**, **Chorus 50 WG**, **Luna experience** (tudi proti listni luknjičavosti koščičarjev in za zmanjševanje sadne gnilobe), **Libreto**, **Prestop**, **Prolectus**, **Revyona**, **Signum**, **Zenby**, **Switch 62,5 WG**. Prvo škropljenje je potrebno opraviti, ko je odprtih najmanj 10% cvetov in drugo, ko začno odpadati prvi venčni listi.

V ekološki pridelavi je dovoljena uporaba **Amylo-X** (od fenofaze mišjega ušesca dalje, uporaba tudi za zmanjševanje okužb z bakterijskim rakom koščičarjev).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in veljavne registracije!

Pripravila: David Snoj in Vesna Kocjan
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 12.03.2024 14:32
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič
Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**
[Seznam registriranih FFS](#)

