

10. VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ - 12.03.2024 14:35 - Zaključeno



Češplje in slive so tik pred cvetenjem. V času cvetenja in deževnega vremena, je treba preprečevati okužbe s cvetno monilijo. Pridelovalci lahko izbirajo med naslednjimi pripravki; **Serenade Aso**, **Amylo-X**, **Chorus 50 WG**, **Luna experience** (tudi proti listni luknjičavosti koščičarjev in za zmanjševanje sadne gnilobe), **Libreto**, **Prestop**, **Prolectus**, **Revyona**, **Signum**, **Zenby**, **Switch 62,5 WG**. Prvo škropljenje je potrebno opraviti v primeru deževnega vremena, ko je odprtih najmanj 10 % cvetov in drugo, ko začno odpadati prvi venčni listi.

V ekološki pridelavi je dovoljena uporaba **Amylo-X** (od fenofaze mišjega ušesca dalje, uporaba tudi za zmanjševanje okužb z bakterijskim rakom koščičarjev) in **Serenade Aso**.

V času pred cvetenjem je treba v nasade namestiti **bele lepljive plošče** (2 plošči /ha), za spremljanje naleta češpljevih grizlic. Proti škodljivcu se ukrepa ob preseženem pragu škodljivosti šele po zaključku cvetenja.

V nasadih sliv in češpelj, ki so še v fazi brstenja, je pred padavinami potrebno opraviti škropljenje s sredstvi na osnovi bakra, s katerimi preprečujemo okužbe z listno luknjičavostjo koščičarjev oz. rožičavosti/metličavosti češpelj. Uporabite lahko **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP** ali **Badge WG** rožičavosti in metličavosti češpelj).

Za varstvo predlistno luknjičavostjo koščičarjev je letos dovoljenje za nujne primere pridobilo sredstvo **Curatio-žvepleno apnena brozga**, namenjeno poklicnim uporabnikom, ki so vključeni v ekološko pridelavo.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in veljavne registracije!

Pripravila: David Snoj in Vesna Kocjan
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 12.03.2024 14:35
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič
Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**
[Seznam registriranih FFS](#)

