

## 10. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.3 - 13.03.2024 07:41 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo zeleni popek (BBCH 55-56) po BBCH skali.

Ob zadnjih padavinah, ko je v Mariboru padlo 25,2 mm padavin, smo zabeležili močan izbruh askospor **jablanovega šklrupa**, bila pa je mogoča tudi močna okužba z jablanovim šklrupom. Ob naslednjih padavinah lahko ponovno pričakujemo močne izbruhe askospor ter nove možne okužbe, zato priporočamo, da škropljenje opravite še **pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu šklrupu** priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan PRO**, **Alcoban**) ali dodina (**Syllit 400 SC**) ali pripravka na osnovi bakra: **Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha)**, **Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha)**, **Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha)** ali **Kocide 2000 (2 kg/ha)**.

Sredstva Syllit se ne sme mešati z možljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je mogoče uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (**Batalion 450 SC**, **Chorus 50 WG**, **Erune 40 SC**, **Laitane**, **Faban**, **Pyrus 400 SC**, **Pyramid**, **Pretil**, **Scala**), ki imajo prednost pred kontaktnimi fungicidi. Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

V nasadih že najdemo izleženo jablanovo travno uš, ki ne povzroča večje škode in jo zato ne zatiramo. V fenološki fazi rdečega balona se prične izleganje **jablanove mokaste uši**. V primeru, da pri pregledu nasada najdete izleženo jablanovo mokasto uš, znaša prag škodljivosti 1 – 2 koloniji na 100 pregledanih cvetnih šopov. V kolikor je ta prag presežen, je mogoče do začetka cvetenja uporabiti pripravke **Tepeki** ali **Afinto** v odmerku 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 L na višinski meter krošnje ali **Neemazal T/S** v odmerku 1,5 L/ha na meter višine krošnje in porabi 300 do 500 L vode na ha na meter višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 4,5L/ha.

V mladih nasadih jablan oz. do največje višine krošnje 2 m lahko za zatiranje jablanove mokaste uši uporabite tudi **Sivanto prime** v najvišjem dovoljenem odmerku 0,4 L/ha (0,2 L/ha na m višine krošnje)

Za omejevanje številčnosti populacije **ameriškega kaparja** priporočamo v nasadih jablan in hrušk, kjer je škodljivec prisoten, uporabo pripravka **Harpun** v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi od 600 do 1000 L vode na ha. Tretiranje se naj opravi **pred cvetenjem**. Sredstvo se lahko na jablanah uporabi na istem zemljišču **največ 2x** v eni rastni dobi (če se s sredstvom tretira jablane pred cvetenjem enkrat, je nato za zatiranje jabolčnega zavijača dovoljeno samo eno tretiranje!!!).

Sadjarji, ki niste uporabili olja, lahko za zatiranje **rdeče sadne pršice** uporabite pripravek **Apollo 50 SC** (uporaba zalog 11.11.2024) v 0,4 L/ha, vendar **najkasneje do fenološke faze rožnatih popkov (BBCH 57)**.

JAVNA SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 13.03.2024 07:41

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

