

21. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 13.03.2024 10:42 - Zaključeno

**Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)**

V Brkinih so nasadi sliv in češpelj v fenofazi BBCH51 (Nabrekanje cvetnih brstov: brsti zaprti, vidne svetlo rjave luske) oz. BBCH53 (Odpiranje brsta: luske razprte, vidni svetlo zeleni deli brsta). Priporočamo, da sadovnjake škropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev**.

Za škropljenje uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Črna češpljeva grizlica in rumena češpljeva grizlica

V nasadih, ki so tik pred cvetenjem je priporočljivo obesiti bele lepljive plošče za spremljanje **rumene** in **črne češpljeve grizlice**. Za hektar nasada se uporabi dve lepljivi plošči (35 x 20 cm).

Datum objave obvestila: 13.03.2024 10:42

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

