



15. VARSTVO JAGOD - 13.03.2024 21:20 - Zaključeno



Nasadi jagod odvisno od lokacije, sorte in tehnologije pridelave dosegajo različne stopnje razvoja. Najpogostejše jih zasledimo med razvojem listov do razvoja prvega niza cvetov na dnu rozete (14 – 55 po lestvici BBCH)

Pridelovalcem svetujemo, da po očiščenju nasadov takoj opravite tudi preventivno varstvo pred morebitnimi **glivičnimi in bakterijskimi okužbami** (bela / rdeča jagodna listna pegavost, črna pegavost jagod, *Xanthomonas fragariae*...).

Priporočamo nanos bakrovih pripravkov kot so: **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,5 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (1,5 kg/ha) ali **NORDOX 75 WG** (3,3 kg/ha).

Zaradi obilnejših padavin je vlažnost v zraku visoka in tunele je potrebno redno zračiti. Jagode, ki so bile očiščene že pred tedni, sedaj intenzivno tvorijo listno maso. Vidne imajo zasnove cvetov. V kolikor nameravate za varstvo pred **sivo plesnijo** uporabljati biotična sredstva, je sedaj primeren čas za prva tretiranja. Uporabite lahko:

- **AMYLO-X**: 1,5 do 2,5 kg na ha pri porabi 500-1000 l vode/ha. S sredstvom se lahko na isti površini tretira v eni rastni dobi največ 6 krat (med fazami 10 in 89 po BBCH), časovni interval med posameznimi tretiranjmi je 7 do 10 dni (tudi za pepelovke).
- **POLYVERSUM**: 0,1-0,2 kg/ha ob porabi vode 300-800 l/ha, dovoljena so 4 tretiranja v eni rastni dobi.
- **UNIVERZALNI FUNGICID**: 1-2g/3-8 l vode/100 m², 4 tretiranja v eni rastni dobi.
- **SERENADE ASO**: 8 l/ha in ob porabi 200 do 1000 l vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od prvega niza cvetov na dnu rozete do polne zrelosti plodov (BBCH 55-89).

Zoper **pepelaste plesni** pa lahko uporabite:

- **KARBICURE**: 3 kg/ha pri porabi vode 250-500 l/ha. Tretiramo lahko od razvojen faze začetka razvoja listov do faze mehčanja jagod (BBCH 10 – 85). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni dobi.
- **VITISAN**: 3 kg/ha ob uporabi vode 500-1000 l/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osem krat v eni rastni dobi, v razmiku od 7 do 10 dni, od pojava 1. lističa do odmiranja listov (BBCH 10-97).
- **AQ-10**: 70 g/ha, na prostem, največ dvakrat v rastni sezoni, od razvitega četrtega lista do faze zrelosti plodu (BBCH 14-89).

Pri rabi biotičnih sredstev upoštevajte, da lahko sočasna raba pripravkov na osnovi bakra negativno učinkuje na njihovo delovanje.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Pripravila: Ivica Imperl in Domen Bajec

Datum objave obvestila: 13.03.2024 21:20

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

