

22. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 14.03.2024 12:46 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Na ravninskih legah nasadi breskev in nektarin prehajajo v fenofazo cvetenja oz. že cvetijo. Pred napovedanimi padavinami je cvetoče nasade potrebno poskropiti proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni uporabite enega od spodaj navedenih registriranih pripravkov.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Amylo-X	1,5 do 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna experience	0,2 l na 1m višine krošnje na ha; najvišji dovoljeni odmerek 0,6 l/ha
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; najvišji dovoljeni odmerek 1 kg/ha
Revyona	1,8 l/ha
Signum	0,25 kg/ha na 1m višine krošnje; najvišji dovoljeni odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; najvišji dovoljeni odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 l/ha

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 14.03.2024 12:46

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

