

11. OBVESTILO O VARSTVU SLIV in ČEŠPELJ - 14.03.2024 13:42 - Zaključeno



Slive in češplje so v fenološki fazi začetek cvetenja (BBCH 61). Za zatiranje **cvetne monilije** v fazi cvetenja (prvič, ko je odprtih vsaj 10% cvetov in drugič, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi) v primeru napovedanih padavin priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Amylo-x** (od 1,5 do 2,5 kg/ha) ali **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha) ali **Luna experience** (0,2 L/ha na m višine krošnje oz. maks. 0,6 L/ha) ali **Libreto** (1,5 L/ha) ali **Mavita 250 EC** (0,22 L/ha) ali **Prolectus** (330 g na višinski meter krošnje na ha, maks. 1 kg/ha) ali **Revyona** (1,8 L/ha) ali **Serenade ASO** (8 L/ha) ali **Score 250EC** (0,22 L/ha) ali **Signum** (0,25 kg/ha na m višine krošnje, maks. 0,75 kg/ha) ali **Switch 62,5 WG** (v konc. 0,08% oz. maks. 1,0 kg/ha) ali **Taegro** (0,185 – 0,37 kg/ha) ali **Teldor** (0,5 L/ha) ali **Zenby** (0,9 L/ha).

V primeru, da se je pri spremljanju **rumene ali črne češpljeve grizlice** na bele lepljive plošče ulovilo skupno več kot 30 osic, lahko takoj **po končanem cvetenju** (ko odpade večino venčnih listov) uporabite pripravek **Mospilan 20 SG** (v 0,04% koncentraciji).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 14.03.2024 13:42

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**[Seznam registriranih FFS](#)