



14. VARSTVO JAGOD - 18.03.2024 13:28 - Zaključeno



Razvoj jagode od brstenja do obiranja poteče zelo hitro. Toplo vreme pa razvoj še pospešuje, zato je treba nasade redno spremljati na pojav škodljivcev in bolezni. Prvi ukrep, da zmanjšamo škodo zaradi bolezni, je odstranjevanje starih rastlinskih delov, saj tako odstranjujemo kleistotecije, hkrati pa tudi druge bolezni in škodljivce (kot so pršice), ki prezimijo v rastlinskih ostankih.

Proti bakterijskim in glivičnim povzročiteljem rastlinskih bolezni je po čiščenju jagod potrebno uporabiti enega izmed bakrovih pripravkov, kot so **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP** ali **Nordox 75 WG**. Škropljenje opravite tik pred napovedanimi padavinami.

Pepelasta plesen jagode prezimi v obliki kleistotecijev, ki spomladi ob ustrezni zračni vlagi razpočijo in sprostijo askuse s sporami, ki na rastlinah kalijo. Te spore okužijo novo priraslo tkivo, zato je pomembno, da ustrezno zaščitimo novo prirast. Optimalni pogoji za razvoj glive so temperature med 15 in 27 °C, visoka zračna vlaga nad 75 % in zmanjšana osvetlitev. Od okužbe do prvih znakov pepelovke lahko pretečejo tudi 4 tedni. Največje težave nastanejo v slabo prezračenih tunelih.

Za varstvo pred jagodno pepelasto plesnijo je pomembno preventivno kemično varstvo z žveplovimi pripravki v zgodnje spomladanskem obdobju. Registrirana sredstva na osnovi žvepla so **Vertipin**, **Thiovit jet** in **Biotip sulfo 800 SC**. Uporaba slednjega je dovoljena od začetka razvoja stolonov (BBCH 41). Žveplo učinkuje šele pri temperaturah nad 15 °C zato uporabo prilagodite vremenskim razmeram. Žveplo ima tudi zaviralno delovanje tudi na razvoj škodljivih vrst pršic, ki se lahko začno pojavljati že zgodaj v začetku vegetacije. Za varstvo proti jagodovi pepelovki se lahko uporabljajo tudi pripravki na osnovi mikroorganizmov. Trenutno sta registrirani sredstvi **AQ-10** (uporaba od razvitega 4 lista dalje) in **Amylo-X** (od pojave prvega lista dalje). Za preventivno uporabo pred pojavom okužbe je na voljo tudi sredstvo **Fytosave**, ki sproži imunski odziv v rastlini, ki pa ga je priporočljivo uporabiti vsaj 3x zapored za doseganje zadostne učinkovitosti.

Vsi omenjeni pripravki za varstvo jagod, so primerni tudi za uporabo v ekološki pridelavi.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte!

Pripravila: Vesna Kocjan in David Snoj
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 18.03.2024 13:28
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: SNOJ David
Pripravil: **David Snoj**
[Seznam registriranih FFS](#)

