

17. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI - 19.03.2024 07:51 - Zaključeno**Fenološki razvoj oljne ogrščice**

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije na večini lokacij v fenološkem razvoju pojava internodijev (35 – 39 po BBCH) oz. na bolj zgodnjih legah v pojavu socvetja (50 – 55 po BBCH).

Zatiranje škodljivcev repičarja (*Meligethes aeneus*) in repičnega kljunotaja (*Ceutorhynchus napi*)

Hroščki **repičarja** se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo samo na način, da raztrgajo cvetove.

Prag škodljivosti za repičarja je presežen, kadar imamo povprečno na posameznih rastlinah 1-2 hrošča v času razpiranja brstov (brsti zavarovani z lističi), ali kadar imamo 2-3 hrošče na rastlino v času nabreklih cvetnih brstov ali 4-6 hroščev na rastlino v času nekaj dni pred razcvetanjem prvih cvetov.

Kljunotaj odlaga jajčeca v vrhne dele stebela, ličinke se nato zavrtajo v notranjost. Steblo oslabi, se deformira in izgubi trdnost. Luski vezani na prizadeti del stebela se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo.

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev na rumeno posodo v treh dneh. V primeru preseženega praga škodljivosti priporočamo njihovo zatiranje.

Uporaba insekticidov je smiselna in smotrna le v primeru, da imate v svojih posevkih presežen prag škodljivosti, kar lahko preverite s postavitvijo rumenih lepljivih plošč ali rumeni lovnih posod.

Rezultati pregledov rumenih lovilnih posod:

Datum	Št. hroščev repičnega kljunotaja Krško	Št. hroščev repičarja Krško	Št. hroščev repičnega kljunotaja Brežice	Št. hroščev repičarja Brežice
06.02.2024	POSTAVITEV VABE			
20.02.2024	53	0		
23.02.2024			POSTAVITEV VABE	
27.02.2024	3	5		
05.03.2024				8
07.03.2024	0			
12.03.2024	5	0		
18.03.2024	5	19		8

Trenutno so na voljo naslednji registrirani insekticidi:

PRIPRAVEK	ODMEREK	REPIČAR	KLJUNOTAJ	OPOMBE / št. dovoljenih tretiranj
DECIS 100 EC	63 ml/ha	X		K / 1
DECIS 2,5 EC	0,3 L/ha	X		K / 2
DELUX 050 CS	0,1 L/ha	X	X	K / 1
EVURE	0,2 L/ha	X	X	K / 1
KARATE ZEON 5 CS	0,15 L/ha	X	X	K / 2
MAVRIK 240 EW	0,2 L/ha	X	X	K / 1
POLECI	0,3 L/ha	X		K / 2

K: kontaktni pripravek.

Zatiranje glivičnih bolezni

S padavinami se bodo povečale tudi možnosti okužbe z glivičnimi boleznimi v oljni ogršči: suha trohnoba stebela ogrščice (*Phoma lingam*), bela zrnata gniloba (*Sclerotinia sclerotiorum*) in črna pegavost (*Alternaria brassicae* spp.).

Na podlagi vremenskih pogojev, zdravstvenega stanja posevka in fenološkega razvoja se odločite za uporabo enega od priporočenih pripravkov.

SREDSTVO	ODMEREK	DELUJE NA	PRIPOROČEN ČAS UPORABE
FOLICUR EW 250 ORIOUS 25 EW	1 L/ha	Zatira: belo gnilobo Zmanjšuje okužbo s: črno listno pegavostjo in suho trohnobo	Od začetka rasti stebela do konca cvetenja (BBCH 30 - 69).
BOUNTY	0,6 L/ha	Zatira: belo gnilobo	Od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60 - 65).
BUZZ ULTRA DF	0,33 kg/ha	Zatira: belo gnilobo	Od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60 - 65).
CARAMBA PLEXEO SIRENA	1,2 L/ha	Zmanjšuje okužbe s: suho trohnobo	Od začetka rasti do začetka cvetenja posevka (BBCH 30 - 69)
CHAMANE NORIOS	1 L/ha	Zatira: belo gnilobo Zmanjšuje okužbe s: pegavostmi iz rodu <i>Alternaria</i>	Ko je odprtih 10 % cvetov do konca cvetenja (BBCH 61 - 69)
CUSTODIA	1 L/ha	Zmanjševanje okužb z: belo gnilobo	Ko je odprtih 10 % cvetov do polnega cvetenja (BBCH 61 - 65)
MAVTA 250 EC SCORE 250 EC	0,5 L/ha	Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost	Od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69)
ORTIVA TAZER 250 SC ZAFTRA AZT 250 SC	1 L/ha	Zmanjšuje okužb s: črno listne pegavostjo, suho trohnobo in belo gnilobo	Prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja (BBCH 60 - 69)
MIRADOR FORTE	1,5 do 2 L/ha	Zatira: črno listno pegavost, suho trohnobo in belo gnilobo	Od začetka rasti stebel do konca cvetenja (BBCH 30 - 69)
PRAKTIS	0,7 L/ha	Zmanjševanje okužb: bela gniloba	od razvojne faze začetka rasti stebela do faze konca cvetenja (BBCH 30 - 69)
PECARI 300 EC PROCER 300 EC PROMINO 300 EC ERA (staro ime TARTAROS 300 EC)	0,6 L/ha	Zmanjšuje okužbe z: suho trohnobo, belo gnilobo	od razvojne faze ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje, do konca cvetenja (BBCH 61-69)

CACTAI TARTAROS			
PROPULSE	1 L/ha	Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost Zmanjšuje okužbe z: belo gnilobo	Od 4 razvitega lista, do faze, ko je 30% luskov doseglo končno velikost (BBCH 14 - 73)
PROTENDO 300 EC	0,6 L/ha	Zmanjševanje okužb s: suho trohnobo Zmanjševanje okužb z: bela gniloba ter črno listno pegavost	od razvojne faze šest listov razvitih do faze rumenega brsta, ko so vidni prvi venčni listi (BBCH 16-59) od razvojne faze začetka cvetenja do faze konca cvetenja (BBCH 61-69)
REYONA	1,5 L/ha	Za zatiranje suhe trohnobe	Od tretjega lista razgrnjenega, do faze, ko so individualni cvetni brsti (glavno socvetje) vidni, vendar še vedno zaprti (BBCH 13-55).
ROYALTY	0,5 kg/ha	Zmanjševanje okužb z: belo gnilobo in črno listno pegavostjo	od razvojne faze pojava socvetja do konca cvetenja (BBCH 55-69)
SISAM	0,8 L/ha	Zatira: belo gnilobo	Ko so odprti prvi cvetovi do konca cvetenja (BBCH 60 - 69)
VELOSTAR	1 L/ha	Za zmanjševanje okužb bele gnilobe in črne listne pegavosti	od začetka cvetenja, ko so prvi cvetovi odprti, do faze konca cvetenja (BBCH 60-69)
TEBUSH 25% EW	1 L/ha	Zatiranje: suhe trohnobe	od pojava cvetnih popkov do polnega cvetenja (BBCH 55-65)
ZENBY	0,8 L/ha	Delno zmanjšuje okužbe: belo gnilobo	Polno cvetenje (BBCH 60 – 65)
POLYVERSUM	0,1 kg/ha	suha trohnoba zelja	2. tretiranje: 9 ali več podaljšanih internodijev vidnih, do faze polnega cvetenja (BBCH 40-65).
		bela gniloba	2. tretiranje: spomladi, od začetka rasti stebela, do faze, ko je 9 ali več podaljšanih internodijev vidnih (BBCH 30-40),

			3. tretiranje spomladi: ko je 9 ali več podaljšanih internodijev vidnih, do faze polnega cvetenja (BBCH 40-65). Če se tretira samo 2-krat, se prvo tretiranje opravi v fazi BBCH 30-40, drugo pa v fazi BBCH 40-65.
		črna listna pegavost kapusnic	ko sta 2 lista razvita, do faze polnega cvetenja (BBCH 12-65). Intervali med tretiranjmi naj bodo 10 dni.
SERENADE ASO	2 l/h	zmanjševanje okužb s koreninsko gnilobo	od prvih odprtih cvetov do konca cvetenja (BBCH 60-69)

Z zeleno barvo označeni pripravki so dovoljeni v ekološki pridelavi.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 19.03.2024 07:51
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: **Karmen Rodič**
Seznam registriranih FFS

