

20. VARSTVO MARELIC - 20.03.2024 16:34 - Zaključeno



Nasadi marelic so večinoma zaključili s cvetenjem (67 – 71 po lestvici BBCH).

Pri poznih sortah je ob nestanovitnem vremenu priporočljivo ob odpadanju venčnih listov opraviti še drugo tretiranje pred **cvetno monilijo**. Za varstvo lahko uporabite enega od sredstev kot so: **AMYLO-X** (1,5 do 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje, oz. največ 3,3 l/ha), **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), **SWTCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 20.03.2024 16:34

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

