

28. VARSTVO HRUŠK IN JABLAN - 21.03.2024 08:51 - Zaključeno



Hruške in jabolane so v Vipavski dolini povečini v fenološki fazi zelenih popkov (BBCH 56). Izjema je hruška 'Junjska lepota', ki na toplih legah že cveti ter nekatere zgodnje sorte jablan, ki že dosegajo stadij rožnatega popka (BBCH 57). V Brkinih in na Tolminskem so jabolane povečini v fazi mišjega ušesa (BBCH 54), posamezne sorte na toplih legah pa že prehajajo v fazo zelenih popkov (BBCH 56).

Zaradi hitrega prirasta listne mase so hruške in jabolane v tem obdobju zelo občutljive za okužbe s škrlupom. Priporočamo, da nasade pred napovedanimi padavinami ponovno preventivno poskropite s kontaktnimi fungicidi. V obdobju pred cvetenjem svetujemo uporabo pripravkov kot so Polyram v odmerku 2,0 kg/ha, Syllit 400 SC v odmerku 1,9 L/ha, Alcoban v odmerku 0,75 kg/ha ali pripravek Delan PRO v odmerku 2,5 L/ha. V primeru napovedi večje količine padavin lahko tudi kombinacijo kontaktnih in anilinopirimidinskih pripravkov.

Sredstvo	Aktivna snov	Odmerek, konc.
Kontaktni fungicidi		
Polyram DF	metiram	2,0 kg/ha
Syllit	dodin	1,9 L/ha
Delan pro	ditanon + kalijeve fosfonati	2,5 L/ha
Alcoban	ditanon	0,75 kg/ha
Anilinopirimidinski fungicidi		
Chorus 50 WG	ciprodinil	0,45 kg/ha
Avalon		1,125 L/ha
Batalion 450 SC		0,7-1,0 L/ha
Erune 40 SC s		1,125 L/ha
Laitane		1,125 L/ha
Mythos		1,5 L/ha
Pretil		1,125 L/ha
Pyramid		1,125 L/ha
Pyrus 400 SC	pirimetanil	1 L/ha
Scala	pirimetanil	1,125 L/ha
Faban	pirimetanil + ditanon	1,2 L/ha

Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih kjer ste imeli v preteklih letih močne okužbe z jablanovo pepelovko je priporočljivo, da v obdobju od brstenja do cvetenja izvajate preventivna škropljenja s pripravki na osnovi žvepla, ki zmanjšujejo infektivni potencial glivice. Močljivo žveplo deluje šele pri temperaturah nad 15 °C, zato je v teh dneh na Primorskem idealen čas za njegovo uporabo. V ta namen lahko pred cvetenjem uporabite: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Sulfar in Vindex 80 WG v najvišjem dovoljenem odmerku 5 - 8 kg/ha Azumo WG v odmerku 7,5 kg/ha, Pol-sulphur 800 SC in Symbiotica fito Tekoče žveplo v odmerku 6 - 7,5 L/ha ter Vertipin v odmerku 5 L/ha

Jablanov cvetožer (*Anthonomus pomorum*)

Zlasti na območju Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožera. Številčnost populacije škodljivca najlažje ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo

škodo na cvetovih. Velikost populacije škodljivca lahko ocenimo tudi s pregledovanjem brstov ter štetjem vbodov in odloženih jajčec. V nasadih s slabšim cvetnim nastavkom proti škodljivcu ukrepamo le v primeru, da smo pri pregledu ugotovili več kot 20% brstov z vbodi ali več kot 15% brstov z odloženimi jajčeci. V nasadih z obilnejšim cvetnim nastavkom je prag višji v obeh primerih za 10% višji.

Za zatiranje cvetožera lahko uporabite pripravek **ASET FIVE v odmerku** 0,96 L pri porabi vode največ 1500 L vode na ha. Priporočeni pH škropilne brozge je 5 do 6. Za doseganje ustreznega pH-ja škropilne brozge uporabite zakisevalce. Priporočeno je škropljenje v večernih urah, ker aktivna snov naravni piretrin na svetlobi hitro razpada. Učinkovitost in obstojnost sredstva povečamo z dodajanjem mineralnih olj. **ASET FIVE** lahko na istem zemljišču uporabite največ dvakrat.

Kaparji, jajčeca rdeče sadne pršice in listnih uši

V Brkinih in na Tolminskem, kjer jablane dosegajo stadij mišjega ušesca ali stadij zelenih popkov (BBCH 54 – 55) oz. fenološko fazo C3 - D po Fleckingerju, je zdaj optimalni čas za uporabo pripravkov na osnovi mineralnih ali rastlinskih olj, ki zmanjšujejo populacijo kaparjev, rdeče sadne pršice in listnih uši. V ta namen lahko uporabite pripravke na osnovi parafinskega olja **Frutapon ali Belo olje Karsia** v odmerku 10 L/ha na meter višine krošnje oz. največ 30 L/ha ter **Ovitex** v odmerku 20 L/ha ali pripravek na osnovi olja oljne ogrščice **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat** v 3 % koncentraciji. Za doseganje večje učinkovitosti oljnih pripravkov je priporočena uporaba v oblačnem vremenu, v razmerah večje relativne zračne vlage in brezvetrju. Boljši nanos oljnih pripravkov dosežemo z dvakratnim škropljenjem vrst v nasprotnih smereh, ob veliki porabi vode 800-1000 L/ha.

Datum objave obvestila: 21.03.2024 08:51

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS

