

13. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - 21.03.2024 11:12 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo zeleni popek - rožnati popek (BBCH 56-57) po BBCH skali.

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili manjši izbruh askospor **jablanovega škrlupa**. Okužba z jablanovim škrlupom pa tokrat zaradi neizpolnjenih pogojev za okužbo na področju Maribora ni bila mogoča. Ob naslednjih padavinah lahko pričakujemo, da bodo izbruhi askospor močnejši, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu**, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan 700WG** - od razvojne faze rožnatih popkov, **Delan PRO**, **Alcoban**) ali dodina (**Syllit 400 SC**).

Sredstva Syllit se ne sme mešati z možljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je mogoče uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (**Batalion 450 SC**, **Chorus 50 WG**, **Erune 40 SC**, **Laitane**, **Faban**, **Pyrus 400 SC**, **Pyramid**, **Pretil**, **Scala**), ki imajo prednost pred kontaktnimi fungicidi. Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

Uporabo pripravkov na osnovi žvepla priporočamo le v primeru, če bodo dnevne temperature presegle 15°C.

Sedaj je čas, da se v nasade jablan izobesijo bele lepljive plošče za spremljanje osic **jabolčne grizlice**. Prag škodljivosti je presežen, ko se na eno ploščo skupno ulovi 30 ali več osic. Po cvetenju jablan je potrebno bele lepljive plošče odstraniti, saj se na njih lovijo čebele in drugi koristni organizmi (polonice in tančičarice).

Datum objave obvestila: 21.03.2024 11:12

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

