

16. Varstvo pečkarjev - 25.03.2024 14:10 - Zaključeno



Fenološki razvoj pečkatih vrst sadja hitro napreduje. Jablane so večinoma v stadiju vidnih cvetnih popkov, ki so še zaprti (BBCH 55) in prehajajo v stadij zelenih cvetnih popkov, ki imajo ločene posamezne še zaprte cvetove (BBCH 56). Zgodne sorte hrušk lahko na posameznih legah že cvetijo. Ukrepanje proti boleznim in škodljivcem je tako potrebno prilagoditi razvoju v sadovnjakih.

Nestanovitno vreme predstavlja nevarnost za primarne okužbe jablanovim škrlupom. V tem času priporočamo uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov kot so **Polyram**, **Syllit 400 SC** oz. **Syllit 544 SC**, **Delan Pro** ali **Alcoban**. V primeru daljših deževnih obdobij je primerna uporaba sistemskih fungicidov iz skupine anilinopiramidinov kot so **Chorus 50 WG**, **Avalon**, **Batalion 450 SC**, **Erune 40 SC**, **Laitane**, **Mythos**, **Pretil**, **Pyramid**, **Pyrus 400 SC** in **Scala**. Vsem sistemskim fungicidom je potrebno dodati enega izmed prej naštetih dotikalnih pripravkov razen sredstvu **Faban**.

V nasadih, ki so pozni z razvojem in še brstijo, uporabite enega izmed bakrovih pripravkov (**Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP**, **Cuprablau Z 50 WP** ali **Kocide 2000**).

V ekološki pridelavi je dovoljena uporaba pripravka **Curatio žvepleno apnena brozga**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko je v tem času priporočljiva uporaba žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki učinkujejo pri temperaturah nad 15°C zato na hladnih legah še nekoliko počakajte na otoplitev. Uporabite lahko enega izmed registriranih sredstev: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit jet**, **Sulfar**, **Vindex 80 WG**, **Azumo WG**, **Pol-sulphur 800 SC**, **Symbiotica fito**, **Tekoče žveplo**, **Vertipin**

V nekaterih nasadih že najdemo jablanov travno uš (običajno je ne zatiramo) ter jablanovo mokasto uš, ki lahko v ugodnih razmerah, povzroči veliko škodo. Tudi krvava uš, ki je prezimila na ranah več letnega lesa, je že aktivna. Začetek razvoja jablanove mokaste uši sovpada z razvojnim stadijem rožnatega popka (BBCH 59). V tem času je potrebno pregledovati nasade. Ob preseženem pragu škodljivosti (1-2 koloniji/100 pregledanih poganjkov) je potrebno opraviti škropljenje, vendar šele ko preidejo drevesa v balonski stadij. Priporočamo uporabo sredstev na osnovi flonikamida kot sta **Teppeki in Afinto**, ki imata stransko delovanje tudi na krvavo uš. Za uporabo proti mokasti uši, je v mladih nasadih registrirano tudi sredstvo **Sivanto Prime**.

Ekološki pridelovalci lahko pred cvetenjem uporabite pripravek **Neemazal**.

Pred začetkom cvetenja je v nasadi pečkatih vrst sadja, potrebno obesiti bele lepljive plošče za spremljanje jabolčne in hruševe grizlice. V kolikor se tekom celotnega cvetenja na ploščo ujame nad 30 osic je prag škodljivosti presežen. Proti škodljivcema se ukrepa šele po zaključenem cvetenju.

Proti amerškemu kaparju lahko pred cvetenjem uporabite pripravek **Harpun**.

V nasadih kjer niste opravili škropljenja z oljnimi pripravki, je do fenološkega stadija rožnati popek dovoljena uporaba pripravka **Apollo 50 SC**, ki je namenjen zatiranju rdeče sadne pršice.

V letošnjem letu je fungicid **Banjo** pridobil izredno dovoljenje za uporabo proti črni listni pegavosti na jablanah in hruškah. Sredstvo je dovoljeno uporabiti 3x v rastni dobi, od razvojne faze rožnatih popkov do sekundarnega odpadanja plodičev. Prva priporočena je aplikacija je v fazi rožnatih popkov in druga po cvetenju.

Sredstvo ima posebne pogoje uporabe: uporaba je dovoljena le v ograjenih nasadih, kjer je nezaposlenim preprečen dostop v nasad, robne vrste oziroma drevesa se sme tretirati le v smeri od ograje, pri polovičnem zaprtju šob, uporaba ročne škropilnice ni dovoljena!

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!

Pripravili: Vesna Kocjan, Primož Žigon in David Snoj
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 25.03.2024 14:10

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Kocjan Vesna

Pripravila: **Vesna Kocjan**

Seznam registriranih FFS

