

17. Varstvo koščičarjev - 25.03.2024 14:13 - Zaključeno



Deževno vreme v času cvetenja koščičastih vrst sadja predstavlja nevarnost za okužbe s cvetno monilijo. Prvo škropljenje je potrebno opraviti, ko je odprtih 10% cvetov in drugo ob odpadanju venčnih listov. Pridelovalci lahko na vseh koščičastih vrstah sadja izbirajo med pripravki; **Amylo-X**, **Luna experience**, **Libreto**, **Prolectus**, **Revyona**, **Signum**, **Taegro**, **Zenby**, **Switch 62,5 WG** ter **Chorus 50 WG** (breskve, nektarine, češplje, slive), **Serenade Aso** (češnje, višnje, slive, češplje), **Duaxo koncentrat in Teldor SC 500** (češnje in višnje).

V času pred cvetenjem je treba v nasade namestiti **bele lepljive plošče** (2 plošči /ha), za spremljanje naleta češpljevih grizlic. Če je po koncu cvetenja ulovljenih več kot 30 osic, je po končanem cvetenju potrebno opraviti škropljenje z insekticidom, kot je pripravek **Mospilan 20 SG**.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!

Pripravili: Vesna Kocjan, Primož Žigon in David Snoj
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 25.03.2024 14:13

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Kocjan Vesna

Pripravila: **Vesna Kocjan**

[Seznam registriranih FFS](#)

