

Osrednja Slovenija - Kmetijski inštitut Slovenije / Jagodičje / 18. Varstvo ameriških borovnic

18. Varstvo ameriških borovnic - 25.03.2024 14:16 - Zaključeno



Pridelovalcem svetujemo pregledovanje nasadov na pojavljanje trosišč (gobic) borovničeve monilije. Primarne okužbe so najpogostejše v vlažnih pomladih z nenadnimi ohladitvami, slednje povečajo občutljivost zelenih tkiv na okužbe. Za zmanjševanje potenciala bolezni priporočamo **posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila**, ki požge gobice in prepreči sproščanje spor. V nasadih, v katerih so že vidni zeleni vršički je potrebna uporaba fungicidov kot so **Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250**. V letošnjem letu je v ta namen na voljo tudi pripravek

Cuprablau Z 35 WG/WP.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!

Pripravili: Vesna Kocjan, Primož Žigon in David Snoj
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 25.03.2024 14:16

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Kocjan Vesna

Pripravila: **Vesna Kocjan**

[Seznam registriranih FFS](#)

