

14. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 26.03.2024 08:36 - Zaključeno



Na območju Celjske in Koroške regije so zgodnje sorte češenj na izpostavljenih legah v fenološki fazi stadija balona BBCH 59 - do začetka cvetenja BBCH 61. Pozne sorte češenj in višenj so v fenološki fazi zelenega popka BBCH 55 - 56

Spremljajte fenološki razvoj. Svetujemo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko je odprtih 10 % cvetov. Ugodne pogoje za širjenje okužb v večjem obsegu ustvarja deževno in hladno vreme. V primeru deževnega vremena v času polnega cvetenja opravite še drugo škropljenje, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Škropljenje češenj in višenj opravite z enim od pripravkov, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)
Luna experience	0,2 L na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,6 L/ha
Revyona	1,8 L/ha
Signum	0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha
Zenby	0,9 L/ha
Duaxo koncentrat	1,1 L na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljeni 3,3 L/ha.
Amylo -X	1,5 – 2,5 kg/ha

Pripravek na osnovi mikroorganizmov Amylo-X ima dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Samo za češnje so proti cvetni moniliji registrirani še pripravki, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)
Prolectus	330 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Switch 62,6 WG	0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Teldor SC 500	0,5L/ha na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1,5 L/ha
Libreto	0,5 L/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek 1,5 L/ha
Serenade ASO	8 L/ha

Pripravek na osnovi mikroorganizmov Serenade ASO ima dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Datum objave obvestila: 26.03.2024 08:36

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

