

23. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 26.03.2024 13:50 - Zaključeno



Nasadi jablan dosegajo fenološko stopnjo rožnati popek (57 po lestvici BBCH). Hruške imajo socvetja v balonskem stadiju (59 po lestvici BBCH), zgodnje sorte začenjajo s cvetenjem.

Pridelovalcem svetujemo, da ob nestanovitnem vremenu, za preventivno varstvo pred primarnimi okužbami **jablanovega škrlupa** opravite tretiranje s fungicidom še pred naslednjimi padavinami. Priporočamo pripravke kot so:

POLYRAM DF (2 kg/ha; datum veljavnosti 28.05.2024), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha; od rožnatih popkov dalje),... V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENABROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred *jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov*), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Proti **jablanovi pepelasti plesni** dodajte 3 do 5 kg(l)/ha **žveplovih sredstev**.

Pred cvetenjem svetujemo tudi varstvo pred **mokasto jablanovo ušjo** (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov) s pripravkom: **TEPPEKI, AFINTO** (oba 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l/ha na višinski meter krošnje) ali **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje še na **krvavo uš**, **sadnega listnega duplinarja, jabolčno grizlico, bolšice, škržate** in je dovoljen za ekološko pridelavo.

Pridelovalce opozarjamo na primeren čas za nameščanje **feromonskih razpršilcev za metodo zbejanja**. Razpršilce (ISOMATE C TT, RAK 3, CHECKMATE PUFFER CM-PRO, SemiosNET-Codling Moth) je potrebno v nasadu namestiti pred začetkom leta **jabolčnega zavijača**, kar sovpada s časom začetka cvetenja.

V nasadih hrušk, ki so močnejše napadeni s **hruševno bolšico**, oz. v nasadih jablane z **ameriškim kaparjem** lahko pred cvetenjem uporabite tudi pripravek **HARPUN** (1 l/ha proti **hruševi bolšici**; 0,5 l/ha proti **ameriškemu kaparju**). Pri tem pazite na varstvo čebel!

Še vedno opozarjamo na potrebno odstranjevanje dreves napadenih s strani **vrtnih zavrtačev**. Hroščki iz skupine podlubnikov so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo **alkoholnih pasti** (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola). Več informacij najdete v video posnetku: <https://www.youtube.com/watch?v=B7nL3GpqEsw&t=147s>.

Pred začetkom cvetenja svetujemo namestitev **belih lepljivih plošč** za spremljanje **jabolčne grizlice**. V primeru preseženega praga škodljivosti (30 osic na ploščo), boste ukrepali po zaključenem cvetenju.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrast.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 26.03.2024 13:50

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

