



24. VARSTVO JAGOD - 26.03.2024 13:52 - Zaključeno



Jagode so trenutno večinoma v razvojni fazi od pojava prvega niza cvetov na dnu rozete do faze začetka cvetenja (BBCH 55 – 61). V tem času posebno pozornost namenjajte prezračevanju tunelov in drugim ukrepom, ki zmanjšujejo prekomerno vlažnost v nasadih. Ta ukrep je pomemben z vidika preprečevanja vseh glivičnih okužb.

Pridelovalcem jagod svetujemo, da v dneh, ko temperature dosežejo vsaj 15°C, uporabite enega od registriranih žveplovih pripravkov, ki delujejo proti **pepelovki** in imajo še stransko delovanje na **pršice**. Na voljo so: **BIOTIP SULFO 800 SC** (3-5 l/ha, do odpiranja prvih cvetov), **THIOVIT JET** (2-4 kg/ha) in **VERTIPIN** (6 l/ha). Proti pepelovki delujejo tudi **FYTOSAVE** (2 l/ha, biotični pripravek prvič uporabimo preventivno, do sedem tretiranj v eni rastni sezoni), **MAMTA 250 EC** (0,5 l/ha, na prostem), **MIRADOR 250 SC** (1 l/ha, na prostem in v zaščiteneih prostorih, do trikrat v eni rastni sezoni), **ORTIVA** (1 l/ha, na prostem in v zaščiteneih prostorih, do trikrat v eni rastni sezoni), **SCORE 250 EC** (0,5 l/ha, na prostem, do dvakrat v rastni dobi), **SERCADIS PLUS** (0,6 l/ha, največ trikrat v eni rastni sezoni, na prostem in v zaščiteneih prostorih), **STROBY WG** (na prostem in v zaščiteneih prostorih, 0,3 kg/ha, največ dvakrat v rastni sezoni), **TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha, na prostem, največ dvakrat v eni rastni dobi) in **ZAFTRAAZT 250 SC** (1 l/ha, na prostem in v zaščitenem prostoru, največ trikrat v eni rastni dobi).

Do okužb z **sivo plesnijo** prihaja že v času cvetenja, simptomi pa se pojavijo kasneje, ob razvoju plodov in zorenju. V kolikor za zaščito uporabljate biotična sredstva, je potrebno njihov nanos ponavljati v skladu z navodili za uporabo. Poleg predhodno navedenih sredstev, dodajamo še pripravka **PRESTOP** (6 kg/ha, tretiranje trikrat zaporedoma v zaščiteneih prostorih) in **TAEGRO** (0,185-0,37 kg/ha, v zaščiteneih prostorih, do dvanajstkrat v eni rastni dobi). V kolikor za zaščito uporabljate sintetična FFS, vam svetujemo, da primeren čas za njihovo uporabo nastopa v teh dneh. Uporabite lahko: **LIBRETO** (1,5 l/ha, na prostem, največ trikrat v rastni sezoni), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha, na prostem in v zaščiteneih prostorih, do trikrat v rastni dobi), **PYRUS 400 SC** (registracija do 30.04.2024, 2 l/ha), **SCALA** (registracija do 30.04.2024, 2 l/ha), **SIGNUM** (1,8 kg/ha, na prostem in v zaščiteneih prostorih, dve tretiranji v rastni dobi, deluje tudi na pepelovko in črno pegavost), **SWTCH 62,5 WG** (1 kg/ha, na prostem in v zaščiteneih prostorih, največ trikrat v eni rastni dobi), **TELDOR SC 500** (1,5 l/ha, na prostem, največ trikrat v eni rastni sezoni) ali **ZENBY** (1,2 l/ha, na prostem in v zaščiteneih prostorih, do dve tretiranji v eni rastni dobi).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Priprava: Ivica Imperl in Domen Bajec

Datum objave obvestila: 26.03.2024 13:52

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

