

19. Zatiranje plevelov v ozimnih žitih - 28.03.2024 10:06 - Zaključeno



Razvoj žit je ob (pre)toplem vremenu in pretežno dobri namočenosti tal letos hiter in je za en do dva tedna hitrejši v primerjavi s povprečnimi leti. V hladnejših območjih Gorenjske in osrednje Slovenije ozimna žita sedaj večinoma zaključujejo z razraščanjem in prehajajo v razvojno fazo kolenčenja. Posevki so večinoma dobro razviti, nekateri tudi precej gosti. Zaradi premokrih tal letos izvajanje mehanskega ukrepa s česali večinoma ne bo mogoče. Kjer herbicidi še niso bili uporabljeni v jeseni se razvijajo tudi pleveli, še posebej na mestih, kjer je sklop iz različnih razlogov redkejši. Širokolistne vrste kot so njivska vijolica, jetičniki, plešec, smolenec, mrtva kopriva ipd. so sedaj večinoma v fazah razvoja stranskih poganjkov ali oblikovanja popkov in cvetov, enoletne trave se razraščajo, tudi trajni pleveli, kot je osat, že odganjajo.

Priporočamo, da pregledate posevke in kjer je potrebno plevela zatirate, čim bodo razmere dopuščale in bodo njive prevozne. Izberite katerega od herbicidov ali njihove kombinacije, s katerimi boste najboljše zatrla prevladujoče plevela v vašem posevku, ob tem pa upoštevajte razvoj žita in plevelov. Za pripravke, ki jih je treba uporabiti do konca razraščanja žit oz. do začetka kolenčenja (do faze BBCH 30, 31) bo kmalu prepozno. Kjer žita že kolenčijo uporabite pripravke, ki jih lahko rabite še od faze BBCH 31 dalje. Na učinkovitost izbranih sredstev vplivajo tudi okoljske razmere, zlasti temperature. Škropljenj ni priporočljivo izvajati takrat, kadar so rastline v stresu bodisi zaradi nizkih temperatur, bolezni ali drugih dejavnikov, tudi pleveli naj bodo v fazi intenzivne rasti.

Škropljenje izvajajte v mirnem vremenu! Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Tabela: Herbicidi za spomladansko zatiranje plevelov v žitih

Pripravki aktivna snov	Odmerek (kg, l/ha)	Registracija in čas rabe	Pleveli
Adentis, Corida, Flame, tribenuron-metil	0,02	P, J od prvega kolenca in najpozneje do zastavičarja (BBCH 31-39)	EŠ
Alliance diflufenikan + metsulfuron metil	0,1	P, J po vzniku, od prvega lista do konca razraščanja (BBCH 10-29)	EŠ
Ally SX, Finy, Savvy metsulfuron-metil	0,03	P, J, Pi, O, R, T jarine: od drugega lista do zastavičarja (BBCH 12-39); ozimine: od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21-39)	EŠ
Arrat dikamba + tritosulfuron	0,2	P, J	Š
Atlantis star jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon-metil	0,2 - 0,33	P, T od treh listov do drugega kolenca (BBCH 13-32)	O in Š
Axial pinoksaden	0,6 - 1,2	P, J od treh listov do zastavičarja (BBCH 13-39)	EO
Axial one florasulam + pinoksaden	1 - 1,3	P, J od prvega lista do faze, ko je viden zastavičar (BBCH 11-37)	Š in O
Basagran 480 bentazon	2,0	P, J, O, R, T od razraščanja do začetka kolenčenja (BBCH 21-31)	Š
Biathlon 4D florasulam + tritosulfuron	0,07	P, J, Pi, R, T od tretjega lista do razvitega zastavičarja (BBCH 13 do 39)	Š
Boudha	0,02	P, J, R, T (O: manjše uporabe)	EŠ

metsulfuron + tribenuron		od razraščanja in najpozneje do zastavičarja (BBCH 21-39)	
Flurostar 200, Starane forte, Tandus 200 EC fluroksipir	0,6 - 0,8	P, J, R, T od dveh razvitih listov do zastavičarja (BBCH 12-39)	EŠ in VŠ
Clyde FX, Flurostar super florasulam + fluroksipir	1,5	P, J, O, R, T od šest stranskih poganjkov do zastavičarja (BBCH 26-39)	Š
Valentia florasulam + fluroksipir	1,2 – 1,6	P, J, O, R, T od treh listov do pozne faze nabrekanja l.nožn. (BBCH 13-45)	Š
Corello duo florasulam + piroksulam	0,170 – 0,265	P, Pi, R, T od začetka razraščanja do faze prvega kolenca (BBCH 21-31)	O in Š
Flyer florasulam	0,1-0,15	P, J, R od treh razvitih listov do zastavičarja, (BBCH 19-39)	Š
Duplosan KV mekoprop – P	2,0	P, J, od razraščanja do kolenčenja (BBCH 21-31)	Š
U 46 M-Fluid MCPA-DMA	1,0	P, J, R, T od 3 stranskih poganjkov do zastavičarja (BBCH 23 - 39)	EŠ, VŠ
Esteron 2,4-D 2-EHE	0,75 - 1,0	P, J, T od konca razraščanja do drugega kolenca (BBCH 22-32)	EŠ
Grodyl amidosilfuron	0,04	P, J, Pi, O, R, T od treh listov do začetka pojavljanja zgornjega lista (BBCH 13-37)	Š
Herbocid XL 2,4-D	1,25	P, J, R, T od sredine razraščanja do konca razraščanja (BBCH 24-29)	EŠ in VŠ
Hussar OD jodosulfuron	0,2	P, J, R, T od faze treh listov do drugega kolenca (BBCH 13–32)	EŠ in VŠ
Hussar star jodosulfuron + tienkarbazon-metil	0,2-0,3	P, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	EŠ in EV
Lector delta diflufenikan + florasulam	0,075 – 0,1	P, J, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Š
Mustang 306 SE 2,4 D + florasulam	0,4 – 0,6	P, J, T od začetka razraščanja do prvega kolenca (BBCH 21-31)	EŠ
Mustang forte 2,4 D + aminipiralid + florasulam	0,8 – 1,0	P, J, O, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Š
Pallas 75 WG piroksulam	0,12 – 0,25	P, R, T od faze dveh listov do drugega kolenca (BBCH 12-32)	O in Š
Quelex flurasulam + halauksifen- metil	0,05	P, J, Pi, R, T spomladi od faze začetnega razraščanja do faze drugega kolenca (BBCH 21-32)	Š
Sekator OD		P, J, R, T	EŠ,

amidosulfuron + jodosulfuron	0,15	ozimine: tretji l. do začetka razv. zastavičarja (BBCH 13-37); jarine: tretji l. do konca razraščanja (BBCH 13-29)	EO in VŠ
Sekator plus 2,4-D + amidosulfuron + jodosulfuron	0,6	P, J, R, T	Š
Xanadu b e n s u l f u r o n + metsulfuron	0,1	P, J, O, R, T ozimine: od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21-39); jarine: od tretjega lista do zastavičarja (BBCH 13-39)	Š

P-pšenica, J-ječmen, Pi-pira, O-oves, R-rž, T-tritikala

Š-širokolistni, O-ozkolistni, EŠ-enoletni širokolistni, EO-enoletni ozkolistni, VŠ-večletni širokolistni

Datum objave obvestila: 28.03.2024 10:06
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**
[Seznam registriranih FFS](#)

