

21. Varstvo koščičarjev - 29.03.2024 11:52 - Zaključeno



Češnje in višnje so na večini opazovanih lokacij tik pred cvetenjem ali pa že cvetijo. Deževno vreme v času cvetenja predstavlja nevarnost za okužbe s cvetno monilijo, zato je v primeru padavin cvetove smiselno preventivno zavarovati pred okužbami z uporabo fungicidov. Prvo škropljenje je potrebno opraviti, ko je odprtih 10% cvetov in drugo ob odpadanju venčnih listov. Sadjarji lahko za varstvo češenj in višenj izbirajo med naslednjimi pripravki: **Luna experience**, **Revyona**, **Signum**, **Zenby**, **Duaxo koncentrat**, **Amylo-x** (dovoljen tudi v ekološki pridelavi). Za varstvo češenj so dodatno registrirani tudi pripravki **Prolectus**, **Switch 62,6 WG**, **Teldor SC 500**, **Libreto** in **Serenade Aso** (dovoljenje tudi v ekološki pridelavi). V primeru deževnega vremena v času polnega cvetenja se drugo škropljenje opravi, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Ko bodo slive in češnje odcvetele, lahko v nasadih kjer spremljate nalet češpljeve grizlice, v primeru preseženega praga škodljivosti (ulovljenih več kot 30 osic na lepljivo ploščo) opravite zatiranje z insekticidom **Mospilan 20 SG**. Lepljive plošče je po cvetenju potrebno odstraniti z dreves.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!

Pripravili: Vesna Kocjan in Primož Žigon
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 29.03.2024 11:52

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Kocjan Vesna

Pripravila: **Vesna Kocjan**

Seznam registriranih FFS

