

23. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.6 - 05.04.2024 08:48 - Zaključeno



Zgodnje sorte jabolan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: polno cvetenje: najmanj 50 % cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65) po BBCH skali.

• JABLANOV ŠKRLUP

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili dva manjša izbruha askospor **jablanovega škrlupa**, vendar pogoji za okužbo z jablanovim škrlupom niso bili izpolnjeni. V primeru napovedanih obilnejših padavin lahko pričakujemo ponovne izbruhe askospor, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu** priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan 700WG** - od razvojne faze rožnatih popkov, **Delan PRO**, **Alcoban**). **Uporaba aktivne snovi ditianon v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi.**

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

ANILINOPIRIMIDINI	IBE oz. SDHI FUNGICIDI
◦ Batalion 450 SC (0,7-1,0 L/ha) ◦ Faban (1,2 L/ha) ◦ Pyramid (1,125 L/ha) ◦ Pyrus 400 SC (1 L/ha) ◦ Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ◦ Scala (1,125 L/ha) ◦ Avalon (1,125 L/ha) ◦ Laitane (1,125 L/ha) ◦ Erune 40 SC (1,125 L/ha) ◦ Pretil (1,125 L/ha)	◦ Difcor 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Difol (3,5 L/ha) ◦ Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha) ◦ Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Revyona (največ 2 L/ha) ◦ Score 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Sercadis (0,25 – 0,3 L/ha) ◦ Sercadis plus (1,2 L/ha)

Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

V **ekološki pridelavi** je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

• JABLANOVA PEPELOVKA

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri **temperaturi nad 15°C** dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ◦ Cosan | ◦ Pepelin |
| ◦ Kumulus DF | ◦ Sulfar |
| ◦ Microthiol disperss | ◦ Thiovit jet |
| ◦ Microthiol special | ◦ Vindex 80 WG |

• JABOLČNA GRIZLICA

Ulov jabolčne grizlice na kontroliranih lokacijah je v letošnjem letu sorazmerno velik in je že presegel prag škodljivosti, ki znaša 30 osic na posamezno belo ploščo. V primeru preseženega praga škodljivosti je mogoče uporabiti **Neemazal – T/S** (1,5 L/ha na meter višine krošnje, poraba vode 300 – 500 L/ha na meter višine krošnje). PO KONČANEM CVETENJU je mogoče uporabiti **Mospilan 20 SG** (0,04 % konc.). Oba naštetata pripravka zatirata tudi sadnega listnega duplinarja in listne uši.

• RDEČA SADNA PRŠICA

Trenutno najdemo rdečo sadno pršico na jablani v stadiju ličink. V primeru, da boste pri pregledu listov našli na enem listu 3 – 4 ličinke ali več, pri naslednjem škropljenju priporočamo uporabo pripravka **Nissorun 10 WP** (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju NE sme preseči 1 kg/ha) ali **Kanemite SC** (0,625 L/ha na meter višine krošnje, največ 1 škropljenje na sezono) Priporočamo škropljenje v večernem ali nočnem času.

• HRUŠEV OŽIG

Po modelu Maryblyt pogoji za okužbe s hruševem ožigom (cvetne okužbe) ob upoštevanju vremenske napovedi v naslednjih petih dneh ne bodo izpolnjeni.

Datum objave obvestila: 05.04.2024 08:48

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOF s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024