

## 34. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 05.04.2024 12:50 - Zaključeno

**Marelična pepelovka**

Nasadi zgodnjih sort marelic prehajajo v fenološko fazo BBCH72 (Zelena plodnica obdana z odmirajočo čašno krono, čašni listi začenjajo odpadati). Sedaj lahko opravimo škropljenje proti **marelični pepelovki**. V omenjeni fenološki fazi se priporoča uporabo sredstev na osnovi **žvepla**. Uporabo pripravkov na osnovi žvepla priporočamo, ko temperature zraka presegajo

15°C.

Pripravki registrirani za zatiranje marelične pepelovke:

| Sredstvo            | Odmerek ali koncentracija          |
|---------------------|------------------------------------|
| Azumo WG            | 7,5 kg/ha                          |
| Biotip Sulfo 800 SC | 6 l/ha                             |
| Cosan               | 5-7,5 kg/ha                        |
| Fytosave            | 2 l/ha                             |
| Kumulus DF          | 5-7,5 kg/ha                        |
| Mavita 250 EC       | 0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha |
| Microthiol Dispers  | 5-7,5 kg/ha                        |
| Microthiol Special  | 5-7,5 kg/ha                        |
| Pepelin             | 5-7,5 kg/ha                        |
| Score 250 EC        | 0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha |
| Sercadis            | 0,15 l/ha                          |
| Sulfar              | 5-7,5 kg/ha                        |
| Thiovit Jet         | 5-7,5 kg/ha                        |
| Vertipin            | 5 l/ha                             |
| Vindex 80 WG        | 5-7,5 kg/ha                        |

Za zatiranje marelične pepelovke in listne luknjičavosti koščičarjev na marelicah je bilo izdano dovoljenje za nujne primere za pripravek Curatio žvepleno apnena brozga. Sredstvo se uporablja od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 l na ha na meter višine krošnje. Sredstvo smejo uporabljati poklicni pridelovalci pečkatega in koščičastega sadja, aktinidije, oljk ter ameriških borovnic, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

**Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

**Listne uši**

Ob zadnjih pregledih nasadov na posameznih lokacijah že opazamo pojav **listnih uši**. Pridelovalcem svetujemo, da pozorno spremljajo razvoj populacij listnih uši in v primeru prekoračenega praga škodljivosti, ki za češpljevo mokasto uš predstavlja 5 % napadenih poganjkov, ukrepajo z registriranimi insekticidnimi pripravki.

| Sredstvo       | Odmerek ali koncentracija |
|----------------|---------------------------|
| AFINTO         | 0,14 kg/ha                |
| ASSET FIVE     | 0,96 l/ha                 |
| MOSPILAN 20 SG | 0,025 – 0,04 %            |
| NEEMAZAL -     |                           |

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| T/S     | 1,5 l/ha na meter višine krošnje; najvišji odmerek ne sme presegati 4,5 l/ha |
| TEPPEKI | 0,14 kg/ha                                                                   |

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo pripravka pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

**Mali zimski pedic**

V preteklih dneh smo v nasadih marelic že opazili prve izlegle gosenice malega zinskega pedica. Pridelovalcem svetujemo, da pozorno spremljajo pojav škodljivca. Za zatiranje gosenic malega zinskega pedica lahko uporabimo registrirane pripravke Agree WG v odmerku 1 kg/ha ali Neemazal-T/S v odmerku 1,5 l/ha na meter višine krošnje (najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 4,5 l/ha)

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

**Listna luknjičavost koščičarjev**

V letošnjem letu je za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev registriran pripravek Orthocide 80WG (manjše uporabe), ki se uporablja v odmerku do največ 1,8 kg/ha pri porabi vode 800-1200 l/ha. Tretira se po cvetenju (od BBCH 71).

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Na spodnji povezavi lahko dostopate do škropilnega programa za varstvo koščičarjev za leto 2024:  
[https://www.kmetijskizavod-ng.si/panoge/varstvo\\_rastlin/2023012508094354/skropilni\\_program\\_za\\_koscicarje\\_v\\_letu\\_2024/](https://www.kmetijskizavod-ng.si/panoge/varstvo_rastlin/2023012508094354/skropilni_program_za_koscicarje_v_letu_2024/)

Datum objave obvestila: 05.04.2024 12:50  
 Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica  
 Objavil/a: Devetak Marko  
 Pripravil: **Marko Devetak**  
 Seznam registriranih FFS