



## 24. OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH BOLEZNI NA ŽITIH - 08.04.2024 09:44 - Zaključeno



V SV Sloveniji so posevki **ječmena** v fazi kolenčenja (BBCH 32 do 33). Na posevkih ječmena smo na nekaterih lokacijah opazili okužbo z **ječmenovo mrežasto pegavostjo** in **ječmenovem listnem ožigom**. Po smernicah integrirane pridelave določimo prag škodljivosti na sledeč način: po diagonali prehodimo njivo in pregledamo liste na 40 bili, prag je presežen, če ima več kot 20-30% rastlin bolezenska znamenja oben bolezni.

Posevki **pšenice** so v fazi kolenčenja (BBCH 32-33). Na nekaterih lokacijah smo opazili pojav **pšenične listne pegavosti**; na listih se pojavi ovalne pege svetlo rjave barve, sredina peg potemni, na odmrlem tkivu se oblikujejo črna trosiča. Prag škodljivosti je presežen, če je v obdobju med drugim kolencem in pojavom zastavičarja, od 20-30 % rastlin z znamenji okužb na najmlajšem listu.

V tem obdobju so mogoče okužbe z **žitno pepelovko**. Prag škodljivosti ugotavljamo tako, da po diagonali prehodimo njivo in pregledamo liste na 40 bili. Prag je presežen, če ima več kot 50-60 % rastlin bolezenska znamenja žitne pepelovke - bele vataste kupčke.

Za zatiranje bolezni na žitih so registrirana sledeča sredstva: **Ascra xpro** v 1,2-1,5 L/ha (pšenica, rž, tritikala), **Zantara** v 1,2-1,5 L/ha (pšenica, rž, ječmen, oves), **Cayunis** v 1 L/ha (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara tritikala, ozimna in jara rž), **Siltra xpro** v 1 L/ha (ozimna in jara pšenica, tritikala, ozimni in jaru ječmen, ozimna in jara rž, ozimni in jari oves), **Elatus era** v 1 L/ha (ozimna in jara pšenica, ječmen, rž, tritikala, pira, oves), **Priaxor EC** v 1,5 L/ha (ozimna pšenica, ozimni in jari ječmen, tritikala, rž), **Mizona** v 1,0 L/ha (jara in ozimna pšenica, jari in ozimni ječmen), **Revystar XL** v 0,75-1,5 L/ha (jara in ozimna tritikala, jara in ozimna rž, jari in ozimni ječmen, jara in ozimna pšenica), **Revytrex** v 1,125 l/ha (jara in ozimna tritikala, jara in ozimna rž, jari in ozimni ječmen, jara in ozimna pšenica), **Librax** v 1,33 -2,0 L/ha (ozimna pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimni tritikali, rži), **Imtrex XE** v 1 l/ha (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara rž, ozimni in jari oves), **Brivela** v 1,5 L/ha (ozimna in jara pšenica), **Empartis** v 1,5 L/ha (jara in ozimna pšenica, jari in ozimni ječmen, jara in ozimna rž, jara in ozimna tritikala), **Caramba**, **Sirena**, **Plexeo**, **Metso** v 1,5 L/ha (ozimni in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna rž, tritikala), **Folicur EW 250** v 1 L/ha (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara rž, oves), **Bounty** v 0,6 l/ha (pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala), **Buzz ultra DF** v 0,33 kg/ha (jara in ozimna pšenica), **Tebusha 25 %EW** v 1 L/ha (ječmen, rž, tritikala, pšenica), **Orius 25 EW** v 1 L/ha (ozimna in jara pšenica, jari ječmen, rž, tritikala), **Eminent 125 EW** v 1 L/ha (ozimna in jara pšenica), **Magnello** v 1 L/ha (pšenica), **Gretek** v 0,5 L/ha (pšenica, rž), **Prosaro** v 1 L/ha (pšenica, ječmen, rž, tritikala), **Input (staro ime Prosaro plus)** v 1,25 L/ha (pšenica, ječmen, rž, oves, tritikala), **Praktis** v 0,8 L/ha (ozimna pšenica), **Verben** v 1 L/ha (pšenica, ječmen, tritikala, rž), **Procer 300 EC**, **Promino 300EC**, **Protendo 300 EC**, **Tartaros Era** (staro ime Tartaros 300EC), **Pecari 300 EC**, **Cactai** vsi v 0,65 L/ha. (pšenica, ječmen, rž in tritikala), **Revystar** v 1,5 l/ha (jara in ozimna pšenica, ječmen, tritikala), **Revycare** v 1,5 L/ha (jara in ozimna pšenica, jara in ozimna rž, jari in ozimni oves, jara in ozimna tritikala), **Duett turbo** v 1,0 L/ha (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara rž, ozimna in jara tritikala, ozimni in jari oves), **Delaro forte** v 1,2 - 1,5 L/ha (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara tritikala, ozimna in jara rž), **Mirador forte** v 1,5 do 2 L/ha (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, tritikala), **Amistar**, **Mirador 250**, **Ortiva**, **Zafra AZT 250 SC** v 1 L/ha (pšenica, ječmena, rž, tritikala), **Tazer 250 SC** v 0,8 L/ha (ozimna pšenica, ozimni in jari ječmen), **Velostar** v 1 l/ha (jara in ozimna pšenica), **Chamane**, **Norios** v 1 L/ha (pšenica, ječmen, rž, tritikala, oves), **Zoxis 250 SC** v 1 L/ha (rž, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara pšenica), **Retengo** v 1,25 L/ha (pšenici, ječmen, rž, tritikala), **Vertipin** v 6 L/ha (jara in ozimna pšenica, ječmen, oves, tritikala), **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**

**Sulfar**, **Microthiol SC**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss vsi** v 5-7,5 kg/ha (ozimna in jara žita; pšenica, ječmen, tritikala, rž), **Microthiol SC** v 5-7,5 L/ha (ozimna in jara žita; pšenica, ječmen, tritikala, rž), **Flexity** v 0,5 L/ha (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimni in jari oves), **Tern** v 0,75 L/ha (ozimna pšenica), **Folpan 500 SC** v 1,5 L/ha (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen), **Polyversum** v 0,1 kg/ha (pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves).

V zadnji dekadi marca smo na rumenih ploščah in na posevkih opazili prve odrasle hroščke **rdečega žitnega strgača**. V drugi dekadi aprila lahko pričakujemo odlaganje jajčec. Zatiramo ličinke. Prag škodljivosti je ena ličinka oziroma eno jajče ce na bilko.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

Datum objave obvestila: 08.04.2024 09:44

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

---



MKGP-UVH/VVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024