



25. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV v KROMPIRJU - 08.04.2024 14:35 - Zaključeno



Za zatiranje plevelov po sajenju in pred vznikom so dovoljeni sledeči herbicidi:

PRIPRAVEK	ODMEREK	KARENCA	DELOVANJE
Stomp Aqua a.s. pendimetalin	2,9 l/ha	ČU	Ko se tla sesedejo
Sharpen 33 EC , Sharpen Plus (a.s. pendimetalin)	3-5 l/ha 2,5 – 4 l/ha	ČU	Enoletne ozkolistne in širokolistne
Sinopia a.s. klomazon + metobromuron	3 l/ha	ČU	Nekatere vrste enoletnega širokolistnega plevela in omejevanje številčnosti populacije navadne kostrebe.
Angelus Clomate a.s. klomazon	0,25 l/ha	ČU	Enoletne širokolistne plevela
Metric a.s. klomazon + metribuzin ni za zelo lahka in peščena tla (Prepovedan na VVOI)	1-1,5 l/ha	ČU	Enoletne ozkolistne in širokolistne - 1,5 l/ha za zatiranje srakonje, pasjega zelišča; - 1 l za metlika smolenec, kopriva, n. slakovec, ščiri, zvezdica, kostreba, muhvič. FITOTOKSIČNOST
Plateen WG 41,5 flufenacet+ metribuzin (Prepovedan na VVOI)	2-2,5 kg/ha	ČU	Talna vlaga: dovolj učinkovit za zatiranje kostrebe, muhviča, latovke, metlik, ščirov, smolenca, dresni, pasjega zelišča, kamilica FITOTOKSIČNOST
Buzzin a.s. metribuzin (Prepovedan na VVOI)	Pred vznikom: 0,75 kg/ha	ČU	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela
Boxer a.s. prosulfokarb	5 l/ha	ČU	Dobro delovanje na: srakoprec, jetičnik, smolenec, kopriva, ogrščica, zvezdica
Stallion sync tec a.s. klomazon pendimetalin	3 L/ha	ČU	Sredstva se ne sme uporabljati na peščenih in zelo rahlih tleh ter na tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske snovi.
Challenge Challenge 600 Chanon a.s. aklonifen	4,0 L/ha 4,0 L/ha 3,0 L/ha	90 dni 90 dni ČU	Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela

Proman a.s metobromuron	3,0 L/ha	ČU	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevla Sredstvom se lahko tretira samo pozne in srednje pozne sorte krompirja, uporaba v zgodnjih sortah krompirja, ki ima vegetacijo krajšo od 115 dni, pa ni dovoljena.
Sencor SC 600 a.s.metribuzin (Prepovedan na VVOI)	Pred vznikom: 0,75 L/HA Po vzniku: 0,15 l/ha	42 DNI	Dobro delovanje na: metlike, njivski slak, rogovilček, dresni, n. grint; fitotoksičnost na sortah; Jaerla, SV 77/40 in 76/48, Dobrin, Eva, Jetta, Voran in Wineta.

Po vzniku krompirja je mogoče za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov sledeči herbicidi:

PRIPRAVEK	ODMEREK	KARENCA	DELOVANJE
Basagran 480 a.s.bentazon (Prepovedan na VVOI)	Po vzniku: 1,5-2 l/ha	ČU	tretira se v razvojni fazi, ko je krompir visok največ 10 cm (BBCH 12-19) in temperatura zraka ne presega 25 °C.
Benta 480 SL a.s.bentazon (Prepovedan na VVOI)	Po vzniku: 2 l/ha	ČU	Tretiramo do višine krompirja 10 cm (BBCH 12-19) v zmerno toplem in jasnem vremenu (10-25 °C) Širokolistni plevli: kamilica, plešec, dresen, metlike, pasje zelišče, njivska redkev, gorjušica, dobra omočenost
Rim 25 WG + močilo a.s. rimsulfuron (Prepovedan na VVOI)	Po vzniku: 60 g/ha	ČU	Enoletni in večletni širokolistni in ozkolistni plevli.
Tarot 25 WG + močilo a.s. rimsulfuron (Prepovedan na VVOI)	Po vzniku: 40 g/ha do 50 g/ha	ČU	Enoletni in večletni ozkolistni plevli ter nekateri širokolistni plevli. (temp. 6 do 25°C), tretiramo v vlažnem in toplem vremenu.
Rincon 25 SG + močilo a.s. rimsulfuron (Prepovedan na VVOI)	Po vzniku: 60 g/ha	ČU	Za zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevla.
Rimuron 25 WG a.s. rimsulfuron+ močilo HELM SURFER PLUS 0,2 L/ha (Prepovedan na VVOI)	20 – 50 g/ha	ČU	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevla ter večletnega ozkolistnega plevla, po vzniku
Agil 100 EC Zetrola a.s.	0,75 -1,5 l/ha 0,75-1,5 L/ha	30 dni 30 dni	Uporaba v zgodnjem krompirju ni dovoljena!

propakvizafop			
Focus ultra a.s. cikloksidim	1-4 l/ha	56 dni	Plevel v fazi 3-5 listov
Targa super a.s. kvizalop- p-butyl)	1,2 do 2 l/ha	45 dni	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevla
Fusilade forte a.s. fluazifop-p- butil	0,8-1,3 l/ha	90 dni	- Enoletni ozkolistni pleveli (razen latovke) - Večletni ozkolistni plevel
Fusilade max a.s. fluazifop-p- butil	1,6 l/ha	90 dni	- za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevla in ljulk (Lolium spp.)
Select super a.s. kletodim	1,0 – 2,5 L/ha	56 dni	- za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevla (1,0 L/ha), enoletne latovke (2 L/ha), plazeče pirnice (2,5 L/ha)

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 08.04.2024 14:35
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: **Jože Miklavc**
[Seznam registriranih FFS](#)

