

28. Varstvo koščičarjev - 09.04.2024 13:42 - Zaključeno



Po zaključenem cvetenju, je v nasadih kjer ste spremljali nalet češpljeve grizlice in je bil prag škodljivosti presežen (ulovljenih več kot 30 osic na lepljivo ploščo), potrebno opraviti zatiranje z insekticidom **Mospilan 20 SG**. Lepljive plošče je po cvetenju nujno potrebno odstraniti z dreves, da preprečimo lovljenje čebel.

Na večini lokacij so koščičaste vrste v fazi polnega cvetenja ali zaključujejo s cvetenjem (breskve in češnje na Primorskem). Drugo škropljenje proti cvetni moniliji je potrebno opraviti po koncu polnega cvetenja, ko začno odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko naslednje registrirane fungicide:

Breskve in nektarine: **Chorus 50 WG, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby, Revyona**. Pripravki na osnovi mikroorganizmov: **Amylo-X, Prestop, Taegro, Serenade ASO**

Češnje in višnje: **Luna experience, Signum, Revyona, Duaxo koncentrat, Zenby**. Pripravki na osnovi mikroorganizmov: **Amylo-X, Prestop, Taegro, Serenade ASO**

Slive in češplje: **Luna experience, Chorus 50 WG, Prolectus, Revyona, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby**. Pripravki na osnovi mikroorganizmov: **Amylo-X, Prestop, Serenade ASO**

Za varstvo breskev in nektarin pred breskovo kodravostjo lahko do konca cvetenja uporabite sredstvi **Syllit 544 SC** ali **Syllit 400 SC**. Škropljenja opravite pred napovedanimi padavinami.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!

Pripravila: Vesna Kocjan in David Snoj
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 09.04.2024 13:42
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Kocjan Vesna
Pripravila: **Vesna Kocjan**
[Seznam registriranih FFS](#)

