

25. Varstvo vinske trte - 11.04.2024 14:11 - Zaključeno



Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 11 – 12 (1 - 2 razprta lista).

Črna pegavost vinske trte

V zadnjih letih v vinogradih opažamo **vedno pogostejši pojav črne pegavosti vinske trte**. Pogoj za okužbo s to glivico je vlažno, deževno vreme v času začetka rasti mladice. Glivica se pojavlja predvsem na občutljivih sorta kot so: Šipon, Rizvanec, Kerner ali Laški rizling. Za okužbe so najbolj občutljive 3 do 10 cm dolge mladice.

Škropljenje opravite **samo v močnejše okuženih vinogradih** pred napovedanimi padavinami. Uporabite enega od kontaktnih fungicidov kot so: **Folpan 80 WDG** (1,9 kg/ha), **Follow WG** (1,9 kg/ha) ali **Polyram DF** (3 kg/ha).

V vinogradih, ki so bili v preteklem letu močno okuženi z **oidijem**, namesto naštetih pripravkov **v fenološki fazi od tretjega do šestega lista**, uporabite v primeru sočasnega zatiranja črne pegavosti pripravek **Universalis** (2 L/ha).

Trsna kodravost ali akarinoza in erinoza

V fenološki fazi D do E (BBCH 11-13) oziroma, ko so **mladice dolge 2 do 5 cm** uporabita za zatiranje akarinoze in erinoze pripravki **Vertimec pro** (1L/ha), ki vpliva tudi na zmanjševanje številčnosti populacije **rdeče sadne pršice pršice** (*Panonychus ulmi*) in **gabrove pršice** (*Eotetranychus carpini*). Za zmanjševanje populacije slednih dveh pršic lahko uporabite tudi pripravke **Nissorun 10 WP**.

OPOZORILO: Sredstvo Vertimec pro je nevarno za čebele. Pred škropljenjem pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarna za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Grozdni sukači

Glede na ekstremno visoke dnevne temperature zraka v prvi dekadi meseca aprila, lahko ob koncu tedna pričakujemo začetek leta metuljčkov križastega (*Lobesia botrana*) in pasastega (*Eupoecilia ambiguella*) grozdnega sukača. Zato izobesite feromonske vabe za spremljanje leta grozdnih sukačev.

Tisti, ki ste se odločili za zatiranje grozdnih sukačev z metodo zbeganja oz. konfuzijo ob koncu tega tedna ali v začetku naslednjega tedna oz. ob ulovu prvih metuljčkov na feromonske vabe, izobesite dispenzorje **ISONET L PLUS**.

Datum objave obvestila: 11.04.2024 14:11

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

